

Vaccins contre l'hépatite B et la méningococcie

Les questions que les élèves posent souvent:

Quelle est la taille des aiguilles?

Les aiguilles sont de la même taille que les aiguilles que votre médecin utilise à son bureau pour vacciner. Ce sont les mêmes aiguilles qu'on utilise pour les bébés.

Est-ce douloureux?

L'injection est ressentie comme un petit pincement. C'est super rapide et la plupart des gens trouvent que ça passe très vite.

Ont-ils besoin d'une autre aiguille pour chaque vaccin?

Le personnel utilise une aiguille stérile différente pour chaque vaccin.

Où est le point d'injection?

Le vaccin se donne dans la partie supérieure du bras dans le muscle deltoïde. Il n'est pas donné sur les fesses.

Dois-je me faire vacciner?

Les vaccins ne sont pas obligatoires. On encourage les élèves à se faire vacciner pour se protéger contre les maladies de l'hépatite B et de la méningococcie.

Pourquoi cela s'adresse-t-il aux élèves de 7^e année?

En Ontario, on a choisi la 7^e année pour plusieurs raisons. Les élèves de la 7^e année peuvent participer à la prise de décision. En outre, le programme s'adresse aux élèves avant qu'ils soient exposés aux risques des maladies de l'hépatite B et de la méningococcie. Les élèves de la 7^e année peuvent se faire vacciner durant les cliniques scolaires, ce qui leur permet d'être protégés contre deux maladies graves en même temps.

Pourquoi les élèves de 7^e année doivent-ils recevoir deux injections contre l'hépatite B?

Le vaccin qu'utilise la Santé publique de Toronto pour le programme de 7^e année se donne en deux doses. Tous les autres groupes d'âge reçoivent 3 injections pour que le vaccin soit efficace. Il faut un certain temps pour que le corps s'immunise contre le virus de l'hépatite B. Chaque injection donne une petite dose du vaccin au corps afin qu'il produise plus de molécules pour lutter (anticorps) contre le virus de l'hépatite B.

Puis-je me faire vacciner par mon médecin?

Oui. Votre médecin peut vous vacciner contre l'hépatite B mais vous devez en défrayer les coûts. Le vaccin Menactra[®] contre la méningococcie, peut aussi être administré par votre médecin avec la permission de la Santé publique de Toronto.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin?

Certaines personnes ont des rougeurs ou de la douleur au point d'injection. Un petit nombre de personnes se sentent fatiguées et font un peu de fièvre après la vaccination. Cela disparaît généralement en dedans de 24 heures. Contactez un médecin ou un professionnel de la santé si vous avez une réaction plus grave.

Où puis-je obtenir plus d'information?

Appelez la ligne d'information sur l'immunisation au 416-392-1250 ou visitez www.toronto.ca/health.