

واکسن منینگوکوکال (ACYW-135 Men) برای دانش آموزان کلاس 7

(این مطالب بزبانهای متعددی موجود است. به تارنمای http://www.toronto.ca/health/immunization_children/index.htm مراجعه فرمائید)

- * در حال حاضر دو نوع واکسن مننژیت (مناکترا و منوئو) در انتاریو موجود است که در مقابل عفونت ناشی از چهار نوع باکتری A, C, Y, W-135 مصونیت ایجاد میکند.
- * اداره بهداشتی انتاریو واکسن ACYW-135 را مجاناً در درمانگاههای مدارس برای دانش آموزان کلاس 7 فراهم میکند.
- * واکسن ACYW-135 جایگزین Men-C میشود که در سالهای پیش داده میشد و فقط در مقابل نوع C کارساز بود.

طرق دیگر جلوگیری از مرض مننژیت چیست؟

- * از استفاده مشترک از چیزهاییکه ممکن است باعث انتشار آب دهان گردند، از قبیل فنجان و بطری آب و خوراک و سایر چیزها خودداری کنید. همواره دهنه سازهای موسیقی را پس از استفاده تمیز کنید.

چه افرادی میتوانند واکسن ACYW-135 را مجانی دریافت کنند؟

- * دانش آموزان کلاس 7 که هیچگاه واکسن دریافت نکرده اند.
- * دانش آموزان کلاس 8 که واکسن را در کلاس 7 دریافت نکردند میتوانند در مدرسه یا درمانگاه محلی واکسینه شوند. جهت اطلاع از زمان کار درمانگاهها به تارنمای اداره بهداشتی تورنتو مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمائید.
- * دکتر خانوادگی شما نمیتواند واکسن مننژیت را مجانی به شما بدهد.

چه کسانی نباید این واکسن را دریافت کنند؟

- * فرزند شما در موارد زیر نباید این واکسن را دریافت کند:
- * قبلاً توسط واکسن ACYW-135 (Menactra) یا Menveo (Menveo) مصون شده
- * قبلاً در مقابل واکسن مننژیت یا اجزاء آن از جمله لاتکس واکنش (بسیار خطرناک) نشان داده.

مرض منینگوکوکال یا مننژیت چیست؟

- * عبارتست از عفونت خون یا جدار مغز و نخاع ناشی از باکتری نیسریامینیزیدینیس.
- * انواع گوناگون باکتری نامبرده وجود دارد. پنج نوع از جمله A, B, C, Y, W-135 باعث تقریباً تمامی عفونتها میگرددند.
- * مننژیت نادر لیکن جدی است. 10 الی 20 مورد سالانه در تورنتو رخ میدهد و 10% از افراد مبتلا ممکن است فوت کنند.

چگونه ممکن است مبتلا به مننژیت شد؟

- * این مرض در موارد تماس نزدیک صورت بصورت معمولاً ضمن بوسیدن یا استفاده مشترک از خوراک و نوشابه و ساز دهنی و بطری آب و سیگار و چیزهای دیگری منتقل میشوند که قبلاً در دهان شخص مبتلا بوده.
- * بودن در یک کلاس یا یک اتوبوس همزمان با شخص مبتلا قابل انتقال نیست.

چه کسانی در خطر ابتلا به مننژیت میباشند؟

- * این مرض ممکن است افراد را بهر سنی که باشند، مبتلا کند.
- * خطر ابتلای کودکان خردسال کمتر از 5 ساله بویژه اطفال کمتر از یکساله از هرکس دیگری بیشتر است.
- * بزرگترین عامل ابتلای مننژیت باکتری در نوجوانان و جوانان است.
- * افراد فاقد طحال یا دارای ضعف مصونیت نیز در معرض خطر بیشتری میباشند.

آیا این مرض علاج پذیر است؟

- * با اقدام سریع پزشکی و مصرف آنتیبیوتیک قابل درمان است.
- * این مرض حتی با درمان صحیح ممکن است وخیم بوده منجر به اشکال شدید یا حتی مرگ گردد.

چگونه میتوانم مانع از ابتلای فرزندم به مننژیت شوم؟

- * با تزریق واکسن مننژیت بفرزندتان او را مصون نمائید.

آیا زدن دو واکسن همزمان به فرزندم صلاح است
* تزریق واکسن مننژیت همزمان با سایر واکسنهای
توصیه شده برای نوجوانان (جگرتیسی و اچ پی وی
و یادآوری واکسن سه گانه کزاز و دیفتیری و
حصبه) اشکالی ندارد.

از کجا ممکن است اطلاعات بیشتری کسب کنم؟
* ضمن مراجعه به تارنمای http://www.toronto.ca/health/cdc/grd7_hepb_men/best_shot_dvd.htm
ویدئوی "Take Your Best Shot" را تماشا کنید.
* ضمن تماس با خط اطلاعات مصونیت تی پی اچ
بشماره 416-392-1250 تماس بگیرید.

* اگر موارد زیر شامل حال فرزند شما میشود، پیش
از تزریق Men ACYW-135 با مسئول طبی
خود مشورت کنید.

* واکنش بدی نسبت بهر نوع واکسن نشان داده
باشد.

* دچار بیماری Guillain-Barre بوده باشد
* آبستن باشد.

* اگر فرزند شما تب داشته یا دچار ناخوشی شدیدتر از
سرماخوردگی خفیف باشد، باید پیش از واکسینه شدن
صبر کند تا حالش بهتر شود.

چه اطلاعات دیگری در باره واکسن مننژیت لازم است
بدانم؟

* فقط یک نوبت واکسن ACYW-135 لازم است.
معلوم نیست که در آینده لازم خواهد بود یاخیر.

* دانش آموزانی که واکسن
meningococcal conjugate C (NeisVac Menjugate
را زده اند، لازم است پیش از دریافت واکسن
ACYW-135 لااقل یکماه صبر کنند.

* در صورتیکه واکسن مننژیت قبلاً به فرزند شما تزریق
شده، این امر باید در کارت سابقه وی قید گردد:
* این اطلاعات را روی فرم رضایت پیوست ذکر
کنید، یا

* ضمن تماس با خط اطلاعات مصونیت بشماره
416-392-1250 سابقه فرزند خود را جاری
کنید.

عوارض جنبی احتمالی تزریق واکسن چیست؟

* در بعضی افراد جای تزریق ممکن است قرمز یا
متورم گردد.

* بازوی شمار معدودی ممکن است تا یکروز دردناک
باشد.

* برخی ممکن است پس از تزریق واکسن بمدت

کوتاهی دچار سردرد و خستگی و ناخوشی شوند.

* عوارض جنبی بندرت شامل اشکال در تنفس یا کهیر
یا تورم گلو و صورت است.

* در صورت وقوع واکنش شدیدی پس از تزریق به
یکنفر طب کار مراجعه کنید.

* پرستاران اداره بهداری تورنتو در درمانگاه مدرسه
حاضر و برای درمان واکنش کارآموده اند.