

Feuille d'information

Septembre 2010

Vaccin contre la méningococcie (Men ACYW-135) pour les élèves de 7^e année

(Feuille d'information disponible en plusieurs langues. Consultez http://www.toronto.ca/health/immunization_children/index.htm)

Qu'est-ce que la maladie de méningococcie ou méningite?

- La maladie de méningococcie est une infection du sang ou de l'enveloppe du cerveau et de la moelle épinière causée par la bactérie *Neisseria meningitidis*.
- Il existe plusieurs types différents de la bactérie *Neisseria*. Cinq types, incluant A, B, C, Y et W-135, provoquent presque toutes les infections.
- La méningite à méningocoques est rare mais grave. Il y a environ 10 à 20 cas par année à Toronto et 1 personne sur 10 va en mourir.

Comment peut-on contracter la maladie de méningococcie?

- La maladie se transmet par la salive à cause d'un contact face à face, habituellement en embrassant quelqu'un ou en partageant de la nourriture, breuvages, instruments de musique, bouteilles d'eau, cigarettes ou autres objets qui ont été mis dans la bouche d'une personne atteinte de la maladie.
- Elle ne se transmet pas en étant dans la même classe ou le même autobus qu'une personne infectée.

Qui est à risque de contracter cette maladie de méningococcie?

- La maladie peut affecter les personnes de tout âge.
- Les enfants de moins de 5 ans et surtout les nourrissons de moins d'un an sont les plus à risques.
- C'est la cause première des cas de méningite bactérienne chez les adolescents et jeunes adultes.
- Les personnes qui n'ont pas de rate ou dont le système immunitaire est compromis, sont aussi à risque accru.

Quels sont les symptômes de cette maladie?

- Les symptômes peuvent se manifester très rapidement et rendre quelqu'un subitement très malade.

- Les symptômes comprennent une fièvre soudaine, un gros mal de tête, nausée, vomissement et fatigue suivie d'une rigidité cervicale, sensibilité à la lumière, étourdissement et une éruption cutanée rouge/pourpre en plaques.

Cette maladie peut-elle être traitée?

- Le traitement comprend des antibiotiques et soins médicaux en temps opportun.
- Même avec le bon traitement, la maladie peut être très grave et peut entraîner des complications graves ou la mort.

Comment puis-je protéger mon enfant contre la maladie de méningococcie?

- Faites vacciner votre enfant contre la méningococcie.
- Deux vaccins contre la méningococcie (Menactra[®] et Menveo[™]) sont offerts en Ontario et ils protègent jusqu'à 98% contre les infections des quatre types de bactéries méningocoques A, C, Y et W-135.
- La Santé publique de Toronto (SPT) offre le vaccin contre la méningite ACYW-135 gratuitement aux élèves de 7^e année lors de cliniques à l'école.
- Le vaccin contre la méningite ACYW-135 remplace le vaccin contre la méningite C (Men-C) qui a été administré au cours des dernières années mais qui protégeait seulement contre le type C.

De quels autres moyens peut-on se protéger contre la maladie de méningococcie?

- Évitez de partager des objets qui peuvent transmettre de la salive comme les tasses, bouteilles d'eau, nourriture et autres ustensiles. Nettoyez toujours les embouchures d'instruments de musique après chaque utilisation.

Page 1 de 2

Feuille d'information

Qui peut se faire administrer le vaccin Men ACYW-135 gratuitement?

- Tous les élèves de 7^e année qui n'ont jamais reçu une dose du vaccin Men ACYW-135.
- Les élèves de 8^e année qui ont raté le vaccin en 7^e année peuvent se faire vacciner à l'école ou lors de clinique communautaire. Consultez le site Web du SPT ou appelez pour connaître les dates et l'horaire des cliniques.
- Les vaccins Men ACYW-135 ne sont pas offerts gratuitement chez votre médecin de famille.

Qui ne devrait pas recevoir ce vaccin?

- Votre enfant ne doit pas se faire administrer ce vaccin s'il ou elle:
 - a déjà été immunisé avec un vaccin Men ACYW-135 (Menactra[®] ou Menveo[™]);
 - a eu une mauvaise (dangereuse) réaction allergique au vaccin contre la méningococcie ou à l'un de ses composants, y compris le latex.
- Consultez votre professionnel de la santé avant de faire vacciner votre enfant contre Men ACYW-135 s'il ou elle:
 - A déjà eu une mauvaise réaction à tout vaccin;
 - A déjà eu le syndrome Guillain-Barré;
 - Est enceinte.
- Si votre enfant fait de la fièvre ou est atteint d'autre chose qu'une simple grippe ou s'il désire attendre de se sentir mieux avant de se faire vacciner.

Que devrais-je savoir de plus sur le vaccin contre la méningococcie?

- Seulement qu'une seule dose du vaccin Men ACYW-135 n'est requis. Il n'y pas d'information indiquant s'il faudra une dose de rappel à l'avenir. Les élèves qui ont reçu le vaccin contre la méningite C (NeisVac[®] Menjugate[®]) doivent attendre au moins un mois avant de se faire administrer le vaccin Men ACYW-135.
- Mettez le dossier de votre enfant à jour s'il ou elle a déjà reçu un vaccin contre la méningococcie:
 - Remplissez ces renseignements sur le formulaire de consentement ci-joint ou

- Appelez la ligne d'information sur l'immunisation au 416-392-1250.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin contre Men ACYW-135?

- Certaines personnes ont des rougeurs et de l'enflure au point d'injection.
- Certains peuvent avoir mal au bras pendant environ une journée.
- D'autres peuvent avoir mal à la tête et se sentir fatigués ou malades pendant une brève période de temps après le vaccin.
- Des effets secondaires plus graves sont rarement rapportés comme des difficultés respiratoires, une éruption cutanée ou le visage ou la gorge enflé.
- Consultez immédiatement un professionnel de la santé si vous avez une réaction grave au vaccin.
- Les infirmières de la Santé publique de Toronto sont présentes lors des cliniques à l'école et elles ont la formation nécessaire pour traiter les réactions graves.

Est-ce que d'administrer deux vaccins à la fois à mon enfant est sécuritaire?

- Il n'y a aucun danger pour votre enfant s'il se fait administrer le vaccin contre la méningococcie en même temps qu'un autre vaccin recommandé aux adolescents (c.à.d. hépatite B, VPH et le vaccin de rappel contre le tétanos-diphthérie-coqueluche).

Où puis-je obtenir plus d'information?

- Visionnez la vidéo "Take Your Best Shot" sur le site Web SPT (http://www.toronto.ca/health/cdc/grd7_hepb_men/best_shot_dvd.htm) pour vous renseigner sur le vaccin contre la méningococcie.
- Appelez la ligne d'information sur l'immunisation au 416- 392-1250.