

2011. szeptember

Meningococcus (Men ACYW-135) védőoltás 7. osztályos tanulónak

(Az ismertető lap számos nyelven elérhető. Lásd http://www.toronto.ca/health/immunization_children/index.htm)

Mi a meningococcus okozta megbetegedés vagy agyhártyagyulladás?

- A meningococcus okozta megbetegedés a vér, valamint az agyat és a gerincvelőt borító szövet *Neisseria meningitidis* nevű baktérium által okozott fertőzése.
- Számos különböző fajtájú *Neisseria* baktérium létezik. Öt típus, köztük az A, B, C, Y és W-135 okozza majdnem az összes fertőzést.
- A meningococcus okozta megbetegedés ritka, de súlyos. Torontóban évente 10–20 eset fordul elő. 10 fertőzött ember közül 1 meghalhat.

Hogyan lehet megkapni a meningococcus okozta megbetegedést?

- A betegség nyállal terjed, az arc beteg ember arcával való szoros érintkezése során, általában csókolózással, egymás ételének vagy italának fogyasztásával, hangszerek, vizesüvegek, cigaretta vagy egyéb szájbán lévő tárgyak beteg emberrel való megosztásával.
- A betegség nem terjed fertőzött személlyel való azonos osztályteremben vagy buszon tartózkodással.

Ki van kitéve a meningococcus betegség kockázatának?

- A betegség bármilyen életkorú embert érinthet.
- Az 5 évnél, illetve leginkább az egy évnél fiatalabb gyermekek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak.
- Tizenévesek és fiatal felnőttek esetében a meningococcus a bakteriális agyhártyagyulladás leggyakoribb kórokozója.
- Akiknek a lépét eltávolították, vagy gyenge az immunrendszerük, szintén

magasabb kockázatnak vannak kitéve.

Mik a betegség tünetei?

- A tünetek nagyon gyorsan alakulhatnak ki, és nagyon súlyos állapotot okozhatnak.
- A tünetek közé a hirtelen kezdődő láz, súlyos fejfájás, hányinger, hányás és fáradtság érzése tartozik, melyet tarkómerevség, fényérzékenység, szédülés és vörös/lila foltos kiütések követnek.

Kezelhető a betegség?

- Időben történő orvosi ellátással és antibiotikumokkal a betegség kezelhető.
- A betegség a megfelelő kezelés ellenére is súlyos lehet, és komoly komplikációk kialakulásához vagy halálhoz vezethet.

Hogyan védhetem meg a gyermekemet a meningococcus okozta megbetegedéstől?

- Oltassa be gyermekét a meningococcus elleni védőoltással.
- Kétféle olyan meningococcus oltóanyag (Menactra[®] és Menveo[™]) kapható jelenleg Ontarióban, amely védelmet biztosít a négyféle meningococcus baktériumtípus, az A, C, Y és W-135 okozta fertőzések 98%-ával szemben.
- A Toronto Public Health (Torontói Közegészségügyi Hivatal, TPH) a 7. osztályos tanulók számára az iskolai rendelőkben ingyenesen biztosítja a Men ACYW-135 védőoltást.
- A Men ACYW-135 védőoltás helyettesíti a korábbi években adott konjugált meningococcus C (Men-C) védőoltást, amely csak a C típus ellen nyújtott védelmet.

Hungarian
1/3 oldal

Milyen egyéb módon lehet megelőzni a meningococcus okozta megbetegedést?

- Kerülje a nyálat tartalmazó tárgyak, például poharak, vizesüvegek, evőeszközök és egyéb eszközök másokkal való megosztását. Minden használat után tisztítsa meg a hangszerek szájba kerülő részeit.

Ki kaphat ingyenes Men ACYW-135 védőoltást?

- Azok a 7. osztályos tanulók, akik korábbi Men ACYW-135 védőoltás dózisban nem részesültek.
- Azokat a 8. osztályos tanulókat, akik nem kapták meg a védőoltást 7. osztályban, be lehet oltani 8. osztályos korukban az iskolában vagy a közegészségügyi intézményekben. Az intézmények rendelési idejét illetően látogasson el a TPH honlapjára.
- A Men ACYW-135 a családorvostól nem kapható ingyenesen.

Kinek tilos beadni a védőoltást?

- Gyermeke nem kaphatja meg a védőoltást, ha:
 - Már korábban kapott Men ACYW-135 védőoltást (Menactra[®] vagy Menveo[™]);
 - Egy korábbi meningococcus védőoltásra, vagy az oltóanyag bármely összetevőjére – a latexet is beleértve – súlyos (életveszélyes) reakciója volt.
- A Men ACYW-135 védőoltás beadása előtt beszéljen azt Önt ellátó egészségügyi szakemberrel, ha gyermeke:
 - Bármilyen oltásra rosszul reagált;
 - Korábban Guillain-Barré szindrómában szenvedett;
 - Terhes.
- Ha gyermeke lázas, vagy egy enyhe náthánál súlyosabb betegsége van, a védőoltás beadásával várni kell, amíg jobban lesz.

Mi mást kell tudni a meningococcus védőoltásról?

- A Men ACYW-135 védőoltásból csak egy adagra van szükség. Arról, hogy a jövőben esetleg szükség lenne ismétlő oltásra, nincs információ.
- Azoknál a tanulóknál, akik konjugált meningococcus védőoltásban részesültek (NeisVac[®] Menjugate[®]) legalább egy hónapot kell várni a Men ACYW-135 védőoltás beadása előtt.
- Frissítse gyermeke oltási könyvének adatait, ha már kapott meningococcus védőoltást:
 - Írja be ezeket az adatokat a mellékelt beleegyező nyilatkozatba vagy
 - Hívja fel a védőoltási információs vonalat a 416-392-1250 telefonszámon.

Mik a Men ACYW-135 védőoltás lehetséges mellékhatásai?

- Egyes embereknél a szúrás helyén vörösség vagy duzzanat alakulhat ki.
- Néhányuknak fájhat a karja, ami nagyjából egy napig tart.
- Egyeseknek fájhat a feje és fáradtnak érezhetik magukat, esetleg rosszul lehetnek a védőoltás után egy rövid ideig.
- Ritkán a mellékhatások között légzési problémák, kiütések, illetve a torok és az arc duzzanata is előfordulhat.
- Ha a védőoltás után súlyos reakció alakul ki, azonnal keressen fel egy egészségügyi szakembert.
- A torontói közegészségügyi ápolók megtalálhatók az iskolai rendelőkben. Képzettségük kiterjed a súlyos reakciók kezelésére is.

Biztonságos gyermekem számára két oltás egyidejű beadása?

- A tizenéveseknek javasolt más oltásokkal (például hepatitis B, HPV vagy a tetanusz-diftéria-szamárköhögés (Di-Per-Te) emlékeztető oltás) együtt beadott meningococcus védőoltás biztonságos.

Hol kaphatok több információt?

- Ha a meningococcus védőoltásról többet szeretne tudni, nézze meg az „Adasd be a legjobb oltást (Take Your Best Shot)” című videót a TPH honlapján http://www.toronto.ca/health/cd/c/grd7_hepb_men/best_shot_dvd.htm.
- Hívja fel a TPH védőoltási információs vonalat a 416-392-1250 telefonszámon.