



سرکی جوؤں کے بارے میں حقائق نامہ



سرکی جوئیں کیا ہیں؟

سرکی جوں ایک کیڑا ہے جو آپ کے سر میں رہتا اور بچے پیدا کرتا ہے۔ سرکی جوئیں آپ کے سر کی کھوپڑی کو کاٹ کر غذا حاصل کرتی ہیں۔ سر میں جوئیں پڑنا (جوں داری) عام ہے؛ ہر سال دنیا بھر میں 6-12 ملین لوگوں کے سروں میں جوئیں پڑتی ہیں۔

کس کے سر میں جوئیں پڑ سکتی ہیں؟

کوئی فرد جب کسی کے ساتھ جس کے سر میں پہلے سے جوئیں ہوں اپنے سر کا سر سے قریبی رابطہ کرتا ہے تو اس کے سر میں جوئیں پڑ سکتی ہیں۔ سرکی جوئیں زیادہ تر 3-10 سال کے درمیان کی عمروں کے بچوں، اور ان کے خاندانوں میں پائی جاتی ہیں۔

مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرے سر میں جوئیں ہیں؟


- بالوں میں کسی چیز کے حرکت کرنے سے گدگدی کا احساس۔
- خارش ہونا، جو کاٹنے کے رد عمل سے الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
- خراش پذیری۔
- کھرپنے کی وجہ سے سر میں سوزش ہونا۔ یہ سوزش کبھی کبھار انفیکشن زدہ ہو جاتی ہے۔

آپ کے سر میں جوئیں کیسے پڑ سکتی ہیں؟

- کسی فرد کے سر کے ساتھ جس کے سر میں پہلے سے جوئیں ہوں سر کے قریبی رابطے سے جوئیں پڑ سکتی ہیں۔ سکول اور گھر میں کھیل کے دوران سروں کا یہ رابطہ عام ہے (سونے والی پارٹیاں، کھیلوں کی سرگرمیاں، کیمپ میں، اور کھیل کے میدان وغیرہ میں)
- ٹوپوں، سر کے رومالوں، کنگھیوں، برشوں، بالوں کے ربوں، ٹکیوں یا تولیوں کے استعمال سے جو کسی نے جس کے سر میں جوئیں ہوں حال ہی میں استعمال کیے ہوں جوئیں پڑ سکتی ہیں۔


دیکھنے میں وہ کیسی لگتی ہیں؟

وہ کیڑے بہت چھوٹے، پروں کے بغیر، تیزی سے حرکت کرنے والے، اور مشکل سے نظر آتے ہیں۔ وہ چھلانگ لگا یا اڑ نہیں سکتے۔ وہ 1-2 ملی میٹر لمبے اور رنگ میں خاکستری براؤن ہوتے ہیں۔ جوؤں کی تین اشکال ہوتی ہیں: لیکھ، نابالغ کیڑا اور بالغ۔



چمکی ہوئی لیکھیں
جنہیں بڑا کر کے
دکھایا گیا ہے

لیکھیں: لیکھیں سرکی جوؤں کے انڈے ہوتے ہیں۔ وہ مشکل سے نظر آتے ہیں اور اکثر سر میں خشکی یا بالوں کے سپرے کے قطروں سے ملتے جلتے لگتے ہیں۔ لیکھیں بالوں کی جڑوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمکی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ وہ بیضوی شکل کی اور عام طور پر پہلی سے سفید ہوتی ہیں۔ لیکھیں بچے نکالنے کیلئے سینے جانے میں تقریباً ایک ہفتہ لیتی ہیں۔



جوئیں
(جنہیں بڑا کر کے دکھایا گیا ہے)

نابالغ کیڑا: لیکھ کو سینے جانے کے بعد اس میں سے ایک چھوٹی جوں پیدا ہوتی ہے جسے نابالغ کیڑا کہتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بالغ سرکی جوں کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ نابالغ کیڑا انڈے سے نکلنے کے بعد تقریباً سات دنوں میں بالغ ہوتا ہے۔ زندہ رہنے کیلئے، نابالغ کیڑے کا خون پلانا لازمی ہے۔ بالغ جوئیں: بالغ جوں تقریباً ایک تل کے بیج کے برابر ہوتی ہے، اس کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں، اور رنگ کتھی سے خاکستری سفید ہوتا ہے۔ مادہ جوئیں لیکھوں کو جنم دیتی ہیں؛ وہ عام طور پر نروں سے بڑی ہوتی ہے۔ بالغ جوئیں کسی فرد کے سر میں 30 دنوں تک زندہ رہ سکتی ہیں۔ زندہ رہنے کیلئے، بالغ جوؤں کو خوراک کے طور پر خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی جوں کسی شخص پر سے گر جائے، تو وہ دو دن کے اندر اندر مر جاتی ہے۔

سرکی جوؤں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟

- سرکی جوؤں کے علاج کیلئے بہت سی مصنوعات دستیاب ہیں۔
- کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے، اپنے فارماسٹ سے بات کریں۔
- مندرجہ ذیل کے علاج سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں:
 - دو سال سے کم عمر کے بچے؛
 - کوئی فرد جسے دورے پڑنے کی بیماری ہو؛
 - ایک شخص جسے کھوپڑی میں انفیکشن ہو۔



عام طور پر کانوں کے ارد گرد،
ماٹھے پر اور گردن کے قریب
پائی جاتی ہیں۔ اور کھوپڑی
کی جلد کے قریب ہوتی ہیں۔

- اپنے ادویات کے سٹور سے سر کی جوڑوں کا شیپو یا سر دھونے کی کریم خریدیں۔
- ہدایات پر احتیاط سے عمل کرتے ہوئے مصنوعات کو استعمال کریں۔ غلط استعمال اور ضرورت سے زیادہ استعمال خطرناک ہو سکتا ہے۔
- سر کی جوڑوں کی مصنوعات سر کی جوڑوں اور بہت سے انڈوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں، لیکن ایک مرتبہ کے علاج سے ہو سکتا ہے سارے انڈوں کا خاتمہ نہ ہو۔
- اسی لئے، کسی بھی نئی پیدا ہونے والی جوڑوں کے بڑے ہونے سے پہلے، ایک مرتبہ کے علاج کے 7-10 دنوں کے بعد دوسری مرتبہ علاج کریں۔
- تھوڑا سا لگا جاتا ہے کہ آپ دونوں مرتبہ علاج کے درمیان میں اور دوسری مرتبہ کے علاج کے بعد شیپو کے استعمال کو محدود رکھیں۔ ایسا کرنا سر کی جوڑوں کی مصنوعات کو زیادہ مؤثر طور پر کام کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
- زندہ جوڑوں کیلئے اور کسی بھی ایسی لیکھوں کیلئے جو ابھی تک موجود ہوں، سر کو علاج کے درمیانی عرصے میں روزانہ چیک کریں۔ دیکھنے میں اپنی مدد کیلئے شفاف روشنی استعمال کریں۔ سر کے تمام حصوں کا احتیاط سے معائنہ کریں اور انگلیوں کے ناخنوں یا لیکھوں نکالنے والی کنگھی سے بالوں کے نچلے حصوں سے ہر لیکھ کو کھینچ کر نکال دیں۔
- پہلی مرتبہ کے علاج کے بعد کے دنوں میں اگر کوئی زندہ جوڑیں پائی جائیں، تو اپنے فارماسٹ سے رابطہ کریں یا اس حقائق نامے کے نیچے دیئے ہوئے فون نمبر پر رابطہ کریں۔
- اس بارے میں مخالفانہ معلومات ہیں کہ آیا سر کی جوڑوں کی مصنوعات کے استعمال کے بعد تمام لیکھوں کو ختم ہو جانا چاہئے۔ ٹورانٹو پبلک ہیلتھ (Toronto Public Health) تمام لیکھوں کے خاتمے کی تجویز پیش کرتی ہے کیونکہ سر کی جوڑوں کی مصنوعات 100% مؤثر نہیں ہیں۔ لیکھوں کا خاتمہ انڈوں میں سے جو مارے نہ گئے ہوں، بچوں کے نکلنے اور نئے پیدا ہونے والی جوان جوڑوں کے دوسروں کے سروں تک پھیلنے کو کم کر سکتا ہے۔ اگر تمام لیکھیں ختم کر دی جائیں تو لیکھوں کے کسی نئے ہجوم کا مشاہدہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔

اگر کسی چھوٹے بچے یا کسی ایسی عورت کے سر میں جوڑیں ہیں، جو حاملہ ہے یا اپنی چھاتیوں سے اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو کیا کرنا چاہئے؟

علاج کیلئے مصنوعات کا چناؤ کرنے سے پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر یا ہسپتال فار سیک چلڈرن (The Hospital for Sick Children) کے مڈرسک (Motherisk) پروگرام کو مشورے کے لئے 416-813-6780 پر کال کریں۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور دوسروں کا علاج کر رہی ہیں، تو پلاسٹک یار بڑے دستا نے پہنیں۔

کیا مجھے اپنے گھر کو صاف کرنے کی ضرورت ہے؟

آپ کو لازماً ٹوپیوں، سر کے رومال، بالوں کے برش، گنگھیاں، یا کوئی بھی دوسری چیز جو پہنی جاتی ہے یا سر پر استعمال کی جاتی ہے دھونی چاہئیں، نیز ٹیکوں کے غلاف، تولیے اور بستری چادریں بھی پہلے اور دوسری مرتبہ کے علاج کے بعد تیز گرم صابن ملے پانی سے دھونے چاہئیں۔ ایسی اشیاء جو مشین میں نہیں دھونی جاسکتیں انہیں ڈرائی کلین کروانا چاہئے یا کسی ہوا بند بیگ میں 10 دنوں سے دو ہفتوں تک رکھنا چاہئے۔ گھر کی اضافی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات قابل مشورہ ہو سکتی ہے کہ ان سطحوں کو ویکيوم (vacuum) کریں جہاں پر سروں کو ڈنکا کر بیٹھا جاتا ہے (مثال کے طور پر صوفے، کار کی سیٹیں اور ہیلمیٹ)۔ کبھی کبھی کیڑے مار سپرے کا استعمال نہ کریں۔

میں سر کی جوڑوں کے پھیلنے پر کیسے قابو پاسکتی رہا سکتا ہوں؟

- سر سے سر کے رابطے کو اور ٹوپیوں، سر کے رومالوں، اور بالوں کے برش اور گنگھیوں کے مشترکہ استعمال کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔
- لمبے بالوں کو پیچھے کی طرف چوٹیوں کی صورت میں باندھیں۔
- یہ دیکھنے کیلئے کہ کسی دوسرے کے سر میں جوڑیں تو نہیں، خاندان کے تمام ممبران اور قریبی رابطے والے تمام لوگوں کے سروں کو چیک کریں۔
- خاندان کے تمام ممبران جن کے سر میں جوڑیں ہیں ان کا ایک ہی وقت میں علاج کیا جانا چاہئے۔
- جس شخص کے سر میں جوڑیں ہیں اس کے تمام قریبی رابطے والوں سے کہیں کہ اپنے سر چیک کریں۔ نیز، بچے کے استاد اور یا ڈے کیئر میں کام کرنے والوں سے بھی کہیں۔
- آپ سر کی جوڑوں والے شیپو یا مصنوعات کے ذریعے سر کی جوڑوں کو نہیں روک سکتے۔ انہیں صرف اس صورت میں استعمال کریں، اگر آپ کے سر میں جوڑیں ہوں۔
- سکول جانے والی عمر کے چھوٹے بچوں کا سر کی جوڑوں کیلئے ہفتہ وار معائنہ کریں؛ اگر جوڑیں پھیلنے کی وبا پھیلی ہو تو اس وقت کثرت سے معائنہ کریں۔

یاد رکھنے والے اہم نقاط

1. اپنے بچے کے احساسات کے بارے میں حساس بنیں!
2. صفائی کی کمی سر کی جوڑوں کا سبب نہیں ہوتی۔
3. دونوں بچوں اور بڑوں کے سر میں جوڑیں پڑ سکتی ہیں۔
4. چھوٹے بال جوڑوں کے پھیلاؤ کو نہیں روک سکتے۔
5. سر کی جوڑیں کتوں، بلیوں یا دوسرے جانوروں پر نہیں رہتیں۔

مزید معلومات کیلئے ٹورانٹو ہیلتھ کوئیکشن کو 416-338-7600 پر کال کریں۔