

# 吡嗪酰胺

## Pyrazinamide (PZA)

Chinese  
Traditional



### 病人服食 結核病藥物指引

#### 什麼是吡嗪酰胺 (Pyrazinamide) ?

吡嗪酰胺 (Pyrazinamide) 是一種用來治療結核病的抗生素，它的用途包括：

1. 治療潛伏性結核病
2. 治癒活性結核病(與其他抗結核藥物合併使用)。

結核病的病菌非常頑強，很難清除。為了消滅所有結核病菌，你必須服食這種藥物兩個月或以上，療程的長短由你的醫生決定。

#### 我如何服食這種藥物？

- 你必須每天服藥，或遵照醫生的指示服食這種藥物，這是非常重要的。
- 如果你停止服藥，應立即通知你的醫生。
- 如果你忘記服食一劑藥，可盡快補服，但切勿一次過服食兩劑藥。
- 嘗試空腹服食藥物，如果你的腸胃感到不適，可與食物一起服食。
- 如果你正服食其他藥物，或因另有需要服食任何新的藥物，切記先通知你的醫生。
- 如果你懷孕或正哺乳，在服藥前，先通知你的醫生。
- 把吡嗪酰胺存放在陰涼乾爽的地方。

在服食藥物期間，切勿喝酒，因為酒精可能會損害你的肝臟。

大多數人只需在療程最初的兩個月服食這種藥物，在這段期間，病人可能每天需要服藥一次、兩次或三次，視乎醫生的處方而定。

#### 我需留意什麼副作用？

- 大多數人服食吡嗪酰胺都不會出現副作用。
- 服食吡嗪酰胺的時候，醫生會經常監察你的情況。
- 一般的副作用包括：
  - 胃部不適／胃口欠佳
  - 骨節疼痛或腫脹
  - 皮疹
  - 對太陽較為敏感
- 如果你出現以下任何較嚴重的副作用，應停止服食藥物，並立即通知你的醫生。
  - 疲勞／非常疲倦
  - 噁心／嘔吐
  - 胃部抽筋
  - 胃口欠佳
  - 皮膚或眼睛呈黃色
  - 尿液非常深色
  - 發熱三天或以上

#### 服食結核病藥物的注意事項

- 每天同一時間服藥，例如：
  - 睡覺前
  - 早上起床時
- 使用按週計算的藥盒
- 每天服藥後在日曆上劃上標記
- 請家人或朋友提醒
- 考慮“直接觀察治療”(Directly Observed Therapy – DOT)

如果你對結核病藥物或結核病有什麼疑問，請聯絡你的醫生，或致電 **416-338-7600** 多倫多公共衛生署

電郵：[targettb@toronto.ca](mailto:targettb@toronto.ca)

網址：[www.toronto.ca/health/tb\\_prevention](http://www.toronto.ca/health/tb_prevention)

 **TORONTO** Public Health