

防止結核病

結核病是可以預防、醫治和痊癒的!

當結核病患者打噴嚏或咳嗽時，病菌散播於空氣中，會傳播結核病(俗稱肺癆)。
任何人都可能感染結核病。




如果你吸入結核菌，結核菌會進入你的肺部。有時候，結核菌會通過肺部進入身體其他部位。

結核菌感染

如果你的身體強壯，便能阻止結核菌繁殖生長。

結核菌在你的體內，卻沒有繁殖和導致你生病，這就是結核菌感染。

- 你不會傳播結核病。
- 你不會感到不適。
- 你的皮膚測試結果可能呈陽性。
- 你的胸肺 X 光檢驗可能看似正常。



你可以服藥，阻止體內的結核菌繁殖和導致你患上結核病。結核病藥物是免費的!

結核病

如果你的身體虛弱，便不能阻止結核菌繁殖生長。當你患有其他疾病、承受壓力或年事漸高，你的身體便會變得較弱。

結核菌一直繁殖生長，導致你生病。這就是結核病。



你能夠傳播結核病。
你可能感到不適：

- 發燒
- 咳嗽(超過三星期)
- 感到疲倦
- 體重減輕
- 夜汗
- 胸口疼痛

你必須服藥治療結核病。醫生會決定你需要服藥多久。結核病藥物是免費的!



請即阻止結核病擴散!