

پیرازینامید (PZA) Pyrazinamide

Farsi



راهنما و دستورالعمل مصرف داروهای بیماری سل

پیرازینامید چیست؟

پیرازینامید (PZA) Pyrazinamide یکی از انواع آنتی بیوتیک (داروهای ضد عفونت) است که از آن برای درمان بیماری سل استفاده می شود. این دارو به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد:

۱. درمان سل غیر فعال (سل پنهان)

۲. درمان بیماری سل (وقتی که همراه با داروهای دیگر

استفاده شود)

میکرب های سل بسیار قوی هستند و از بین بردن آنها آسان نیست. بمنظور از بین بردن و کشتن این باکتری، باید بمدت دو ماه یا بیشتر از این دارو استفاده کرد. مدت دقیق مصرف دارو را پزشک شما تعیین می کند.

چگونگی مصرف این دارو

• مصرف این دارو بطور روزانه و بدون وقفه و یا بنا به دستور پزشک دارای اهمیت ویژه است

• اگر مصرف این دارو را متوقف کردید، فوراً پزشک خود را مطلع کنید

• اگر مصرف بموقع دارو فراموش شد، هر چه زود تر آنرا بخورید.
• سعی کنید که دارو را قبل از غذا و با شکم خالی مصرف کنید. اما در صورتیکه این شیوه حال شما را بهم می زند، می توانید آنرا همراه غذا مصرف کنید

• بخاطر داشته باشید که پزشک خود را از داروهای دیگری که مصرف می کنید و یا مصرف خواهید کرد، مطلع کنید

• اگر حامله هستید و یا بچه شیر میدهید، قبل از مصرف این دارو، با پزشک خود مشورت کنید

• این دارو (PZA) را در جای خشک و خنک نگهداری کنید در طول مدتی که از این دارو استفاده می کنید، از مصرف مشروبات الکلی خودداری کنید. در غیر اینصورت کبد شما صدمه خواهد دید.

اغلب افراد فقط در طول دو ماه اول مدت درمان، روزانه یک، دو و یا سه بار (بسته به دستور پزشک)، باید این دارو را مصرف کنند.

به چه عوارض جانبی استفاده از این دارو، باید توجه داشت؟

- اکثر افراد مشکلی با مصرف این دارو (PZA) ندارند
- در طول مدت مصرف این دارو (PZA) باید بطور منظم تحت نظر پزشک معالج خود باشید

نمونه هایی از عوارض جانبی این دارو عبارتند از:

- دل بهم خوردگی و از دست دادن اشتها
 - تورم و درد مفاصل
 - التهاب پوست
 - حساسیت بیشتر به نور خورشید
- در صورت بروز هر کدام از عوارض جانبی جدی تر پائین،

مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک خود تماس بگیرید

- احساس خستگی مفرط
- حالت تهوع و استفراغ
- دل درد های مقطع
- از دست دادن اشتها
- زردی پوست و چشمها
- ادرار با رنگ بسیار تیره
- تب مداوم برای بیشتر از سه روز

یادآوری چند نکته در باره مصرف داروهای سل

- داروهای خود را سر وقت و بطور منظم مصرف کنید. مثلاً:
 - قبل از خواب یا - اول صبح
- از ظرف های تقسیم هفتگی قرص ها استفاده کنید
- هر روز بعد از خوردن قرص هایتان، روی تاریخ همان روز روی تقویم، علامت بگذارید
- از یکی از اعضای خانواده یا دوست خود بخواهید که وقت خوردن قرص را به شما یادآوری کند
- از خدمات برنامه نظارت مستقیم در طول درمان (DOT) استفاده کرده و کمک بگیرید

اگر هر گونه سوالی در باره داروها و یا بیماری سل دارید، لطفاً با پزشک خود و یا سازمان بهداشت عمومی تورنتو با شماره تلفن ۴۱۶-۳۳۸-۷۶۰۰ تماس بگیرید.

Email: targettb@toronto.ca

آدرس اینترنت: www.toronto.ca/health/tb_prevention