

ریفامپین (Rifampin) Farsi



راهنما و دستورالعمل مصرف داروهای بیماری سل

ریفامپین چیست؟

ریفامپین (Rifampin) یکی از انواع آنتی بیوتیک (داروهای ضد عفونت) است که از آن برای درمان بیماری سل استفاده می شود. این دارو به دو منظور مورد استفاده قرار می گیرد:

۱. درمان بیماری سل (وقتی که همراه با داروهای دیگر استفاده شود)

۲. در بعضی اوقات، معالجه سل غیر فعال (سل پنهان)

میکروب های سل بسیار قوی هستند و از بین بردن آنها آسان نیست. بمنظور کشتن و از بین بردن این باکتری و بهبود کامل از بیماری سل، باید بمدت ۶ تا ۱۲ ماه این دارو را مصرف کنید. مدت دقیق مصرف دارو را پزشک شما تعیین می کند.

چگونگی مصرف این دارو

مصرف این دارو بطور روزانه و بدون وقفه و یا بنا به دستور پزشک دارای اهمیت ویژه است

اگر مصرف این دارو را متوقف کردید، فوراً پزشک

خود را مطلع کنید

اگر مصرف بموقع دارو فراموش شد، هر چه زود تر آنرا بخورید.
سعی کنید که دارو را قبل از غذا و با شکم خالی مصرف کنید. اما در صورتیکه این شیوه حال شما را بهم می زند، می توانید آنرا بعد از غذا مصرف کنید

این دارو (RMP) را در جای خشک و خنک نگهداری کنید
در طول مدتی که از این دارو استفاده می کنید، از مصرف مشروبات الکلی خودداری کنید. در غیر اینصورت کبد شما صدمه خواهد دید.

بخاطر داشته باشید که پزشک خود را از داروهای دیگری که مصرف می کنید و یا مصرف خواهید کرد، مطلع کنید
در طول مدتی که از این دارو استفاده می کنید، ممکن است که قرص های ضدحاملگی بی اثر باشند.

- اگر حامله هستید و یا بچه شیر می دهید، قبل از مصرف این دارو، با پزشک خود مشورت کنید
- در طول مدتی که این دارو را مصرف می کنید، از لنز چشم نوع نرم استفاده نکنید.

به چه عوارض جانبی استفاده از این دارو، باید توجه داشت؟

- اکثر افراد مشکلی با مصرف این دارو (RMP) ندارند
- در طول مدت مصرف این دارو (RMP) باید بطور منظم تحت نظر پزشک معالج خود باشید

نمونه هایی از عوارض جانبی این دارو عبارتند از:

- دل بهم خوردگی
 - التهاب پوست و خارش
 - عوارض شبیه آنفلوآنزا (تب، لرز، سرگیجه، تنگی نفس)
- در صورت بروز هر کدام از عوارض جانبی جدی تر پائین، مصرف دارو را قطع کنید و با پزشک خود تماس بگیرید

- احساس خستگی مفرط
- حالت تهوع و استفراغ
- دل درد های مقطع
- از دست دادن اشتها
- زردی پوست و چشمها
- ادرار با رنگ بسیار تیره
- تب مداوم برای بیشتر از سه روز

یادآوری چند نکته در باره مصرف داروهای سل

- داروهای خود را سر وقت و بطور منظم مصرف کنید. مثلاً:
 - قبل از خواب
 - اول صبح
 - از ظرف های تقسیم هفتگی قرص ها استفاده کنید
 - هر روز بعد از خوردن قرص هایتان، روی تاریخ همان روز روی تقویم، علامت بگذارید
 - از یکی از اعضای خانواده یا دوست خود بخواهید که وقت خوردن قرص را به شما یادآوری کند
 - از خدمات برنامه نظارت مستقیم در طول درمان (DOT) استفاده کرده و کمک بگیرید
- اگر هر گونه سوالی در باره داروها و یا بیماری سل دارید، لطفاً با پزشک خود و یا سازمان بهداشت عمومی تورنتو با شماره تلفن ۷۶۰۰-۳۳۸-۴۱۶ تماس بگیرید.

Email: targettb@toronto.ca

آدرس اینترنتی: www.toronto.ca/health/tb_prevention