

Éthambutol (EMB)

French



Guide des patients pour la prise de médicaments contre la tuberculose

Qu'est-ce que l'éthambutol?

L'éthambutol est un antibiotique utilisé dans le traitement de la tuberculose (en association avec d'autres médicaments).

Les germes de la tuberculose sont très résistants et difficiles à éliminer. Vous devrez prendre ce médicament pendant deux mois ou plus pour venir à bout de la bactérie de la tuberculose. Votre médecin décidera de la durée exacte de votre traitement.

Comment dois-je prendre ce médicament?

- Il est très important de prendre le médicament tous les jours **ou** selon les instructions du médecin.
- **Prévenez immédiatement votre médecin si vous cessez de prendre le médicament.**
- Si vous avez sauté une dose, prenez-la dès que possible, mais ne prenez jamais deux doses à la fois.
- Vous pouvez prendre le médicament avec ou sans aliments.
- Entrez-le dans un endroit frais et sec.
- Si vous prenez d'autres médicaments ou de nouveaux médicaments, n'oubliez pas d'en informer votre médecin.

* Ce médicament peut être pris une ou deux fois par jour selon ce que votre médecin vous prescrira.

* Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, prévenez votre médecin avant de prendre le médicament.

Est-ce que je risque d'avoir des effets secondaires?

- Vous devrez être suivi régulièrement par votre médecin pendant le traitement.
- **Certains des effets secondaires les plus courants sont :**
 - perte d'appétit;
 - maux d'estomac;
 - éruption cutanée.
- **En présence de l'un des effets secondaires plus graves suivants, cessez de prendre le médicament et appelez votre médecin :**
 - L'éthambutol peut diminuer l'acuité visuelle dans l'un ou les deux yeux. Si votre vue est brouillée ou que votre perception des couleurs change, appelez sans tarder votre médecin.
 - Si vous prenez ce médicament pendant plus de deux mois, vous devrez subir un examen de la vue.

Conseils pour la prise de médicaments contre la tuberculose

- Prenez vos médicaments au même moment tous les jours, par exemple :
 - avant de vous coucher;
 - le matin au lever.
- Utilisez un pilulier hebdomadaire.
- Marquez sur un calendrier chaque jour où vous avez pris vos médicaments.
- Demandez à un membre de votre famille ou un ami de vous rappeler de prendre vos médicaments.
- Envisagez de suivre un traitement sous observation directe (TOD).

Si vous avez des questions sur vos médicaments ou la tuberculose, appelez votre médecin ou le Bureau de santé publique de Toronto au **416 338-7600**.

Courriel : targettb@toronto.ca

Site Web : www.toronto.ca/health/tb_prevention

