

Rifampine (RMP)

French



Guide des patients pour la prise de médicaments contre la tuberculose

Qu'est-ce que la rifampine?

La rifampine est un antibiotique utilisé dans le traitement de la tuberculose. On peut l'utiliser de deux façons :

1. pour traiter une tuberculose active (en association avec d'autres médicaments);
2. pour traiter une tuberculose latente dans certains cas.

Les germes de la tuberculose sont très résistants et difficiles à éliminer. Vous devrez prendre ce médicament pendant 6 à 12 mois pour venir à bout de la bactérie et traiter la tuberculose. Votre médecin décidera de la durée exacte de votre traitement.

Comment dois-je prendre ce médicament?

- Il est très important de prendre le médicament tous les jours **ou** selon les instructions du médecin.
- **Prévenez immédiatement votre médecin si vous cessez de prendre le médicament.**
- Si vous avez sauté une dose, prenez-la dès que possible, mais ne prenez jamais deux doses à la fois.
- Essayez de prendre le médicament à jeun. S'il vous donne des maux d'estomac, prenez-le après le repas.
- Entrez-le dans un endroit frais et sec.

ABSTENEZ-VOUS de toute consommation d'alcool lorsque vous prenez ce médicament, vous pourriez endommager votre foie.

- Si vous prenez d'autres médicaments ou de nouveaux médicaments, n'oubliez pas d'en informer votre médecin.
- La prise de ce médicament **risque de neutraliser** les effets des contraceptifs oraux.
- Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament.

- Ne portez pas de verres de contact souples lorsque vous prenez ce médicament.

Est-ce que je risque d'avoir des effets secondaires?

- En général, la prise de ce médicament ne pose aucun problème.
- Vous devrez être suivi régulièrement par votre médecin pendant le traitement.
- **Certains des effets secondaires les plus courants sont :**
 - maux d'estomac,
 - coloration orange ou rouge de la salive, des larmes, de l'urine, des selles (sans danger);
 - éruption cutanée, démangeaison;
 - symptômes semblables à ceux de la grippe (fièvre, frissons, vertige, essoufflement)
- **En présence de l'un des effets secondaires plus graves suivants, cessez de prendre le médicament et appelez votre médecin :**
 - fatigue / sensation d'épuisement;
 - nausée / vomissements;
 - crampes d'estomac;
 - perte d'appétit;
 - coloration jaune de la peau ou des yeux;
 - urine très foncée;
 - fièvre qui persiste trois jours ou plus.

Conseils pour la prise de médicaments contre la tuberculose

- Prenez vos médicaments au même moment tous les jours, par exemple :
 - avant de vous coucher;
 - le matin au lever.
- Utilisez un pilulier hebdomadaire.
- Marquez sur un calendrier chaque jour où vous avez pris vos médicaments.
- Demandez à un membre de votre famille ou un ami de vous rappeler de prendre vos médicaments.
- Envisagez de suivre un traitement sous observation directe (TOD).

Si vous avez des questions sur vos médicaments ou la tuberculose, appelez votre médecin ou le Bureau de santé publique de Toronto au **416 338-7600**.

Courriel : targettb@toronto.ca

Site Web : www.toronto.ca/health/tb_prevention

