

Ethambutol (EMB)



Betegtájékoztató a TBC elleni gyógyszer szedéséről

Mi is az ethambutol?

Az ethambutol (EMB) a TBC-s megbetegedés gyógyítására használt antibiotikum (egyéb gyógyszerekkel együtt)

A TBC kórokozója nagyon erős, és nehéz meg szabadulni tőle. Ezt a gyógyszert két vagy több hónapig kell szedni ahhoz, hogy elpusztítsa a TBC baktériumokat. Az orvos dönti el, hogy pontosan hány hónapig kell szedni a gyógyszert.

Hogyan kell szedni ezt a gyógyszert?

- A gyógyszert minden nap be kell venni, **vagy** ahogyan az orvos elrendelte
- **Rögtön tudatni kell az orvossal, ha a gyógyszer szedését elhagytuk**
- Ha egy dózis kimarad, vegyük be, amint lehet; de dupla dózist sose vegyünk be egyszerre
- Ez a gyógyszer szedhető evés közben vagy az étkezéstől független időpontokban
- Az EMB hűvös, száraz helyen tartandó
- Ne feledjük tudatni orvosunkkal, hogy milyen más gyógyszereket is szedünk, vagy hogy milyen új gyógyszerek szedését kezdtük el

* Ezt a gyógyszert naponta egyszer vagy kétszer szedjük attól függően, hogy az orvos hogyan rendelte.

* Terhes és szoptató anyák beszéljenek orvosukkal, mielőtt ezt a gyógyszert szedni kezdik.

Néhány mellékhatás, amire ügyelni kell.

- Az ethambutolt szedő betegek rendszeres orvosi ellenőrzés alatt kell állniuk
- **Néhány tipikus mellékhatás:**
 - Étvágytalanság
 - Émelygés
 - Bőrkiütés
- **Ha az alább felsorolt súlyosabb mellékhatások bármelyikét tapasztaljuk, ne szedjük tovább a gyógyszert, és hívjuk fel az orvost**
 - Az EMB befolyásolhatja, hogy milyen jól látunk egyik vagy mindkét szemünkkel. Homályos látás, vagy a színek érzékelésében bekövetkezett változás esetén sürgősen lépünk kapcsolatba orvosunkkal.
 - Meg kell vizsgáltatni szemünket, ha két hónapnál tovább szedjük ezt a gyógyszert

Tanácsok a TBC elleni gyógyszer szedéséhez

- Minden nap ugyanazon időben vegyük be a gyógyszert, pl.:
 - Lefekvés előtt
 - Ébredés után első tevékenységünként
- Használjunk egy, a hét napjaira felosztott pirula-dobozkát
- Jelöljük meg minden napot a naptárban, amikor a gyógyszert bevettük
- Kérjünk meg egy családtagot vagy barátot, hogy emlékeztessen rá
- Vegyük fontolóra, hogy ellenőrzés alatt szedjük gyógyszereinket: az ún. Directly Observed Therapy (DOT) lehetőségét

Gyógyszereinkkel vagy a TBC-vel kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk orvosunkhoz, vagy hívjuk a Torontói Egészségügyi Hatóságot (Toronto Public Health) a 416-338-7600-as telefonszámon.

E-mail: targettb@toronto.ca

Weboldal: www.toronto.ca/health/tb_prevention