

Pyrazinamide (PZA)



Betegtájékoztató a TBC elleni gyógyszer szedéséről

Mi is a Pyrazinamide?

A pyrazinamide (PZA) a tuberkulózis (TBC) kezelésére használt antibiotikum. Kétféleképpen használható:

1. A nem aktív (lappangó) TBC kezelésére
2. A TBC-s megbetegedés gyógyítására (egyéb gyógyszerekkel együtt)

A TBC kórokozója nagyon erős, és nehéz meg szabadulni tőle. Ezt a gyógyszert két vagy több hónapig kell szedni ahhoz, hogy elpusztítsa a baktériumokat. Az orvos dönti el, hogy pontosan hány hónapig kell szedni a gyógyszert.

Hogyan kell szedni ezt a gyógyszert?

- A gyógyszert minden nap be kell venni, **vagy** ahogyan az orvos elrendelte
- **Rögtön tudatni kell az orvossal, ha a gyógyszer szedését elhagytuk**
- Ha egy dózis kimarad, vegyük be, amint lehet; de dupla dózist sose vegyünk be egyszerre
- Próbáljuk meg üres gyomorra bevenni. Ha ez émelygést okoz, szedjük evés közben
- Ne feledjük tudatni orvosunkkal, hogy milyen más gyógyszereket is szedünk, vagy hogy milyen új gyógyszerek szedését kezdtük el
- Terhes és szoptató anyák beszéljenek orvosukkal, mielőtt ezt a gyógyszert szedni kezdik
- A PZA hűvös, száraz helyen tartandó

Amíg ezt a gyógyszert szedjük **NEM SZABAD** alkoholt fogyasztani. Májkárosodást okozhat.

Ezt a gyógyszert legtöbbször csak a kezelés első két hónapjában szedik. Ez idő alatt naponta valószínűleg egyszer, kétszer, vagy háromszor

kell bevenni, attól függően, hogy az orvos hogyan rendelte.

Néhány mellékhatás, amire ügyelni kell.

- A legtöbb betegnél semmi probléma nem jelentkezik, míg a PZA-t szedik
- A PZA-t szedő betegnek rendszeres orvosi ellenőrzés alatt kell állnia
- **Néhány tipikus mellékhatás:**
 - Émelygés/ étvágytalanság
 - Megdagadt vagy fájó ízületek
 - Bőrkiütés
 - Fokozott napérzékenység
- **Ha az alább felsorolt súlyosabb mellékhatások bármelyikét tapasztaljuk, ne szedjük tovább a gyógyszert, és hívjuk fel az orvost**
 - Kimerültség/ nagymértékű fáradtság
 - Hányinger/ hányás
 - Gyomorgörcsök
 - Étvágytalanság
 - Sárgás bőr vagy szemek
 - Nagyon sötét vizelet
 - 3 vagy több napig tartó láz

Tanácsok a TBC elleni gyógyszer szedéséhez

- Minden nap ugyanazon időben vegyük be a gyógyszert, pl.:
 - Lefekvés előtt
 - Ébredés után első tevékenységünként
- Használjunk egy, a hét napjaira felosztott pirula-dobozkát
- Jelöljük meg minden napot a naptárban, amikor a gyógyszert bevettük
- Kérjünk meg egy családtagot vagy barátot, hogy emlékeztessen rá
- Vegyük fontolóra, hogy ellenőrzés alatt szedjük-e gyógyszereinket: az ún. Directly Observed Therapy (DOT) lehetőségét

Gyógyszereinkkel vagy a TBC-vel kapcsolatos kérdéseinkkel forduljunk orvosunkhoz, vagy hívjuk a Torontói Egészségügyi Hatóságot (Toronto Public Health) a 416-338-7600-as telefonszámon.

E-mail: targettb@toronto.ca

Weboldal: www.toronto.ca/health/tb_prevention