

에탐부톨(EMB)

Ethambutol (EMB)

Korean



항결핵 치료제 복용 안내

에탐부톨은 어떤 약입니까?

에탐부톨(EMB)은 항생제로 (다른 약과 함께 사용하는 경우) 결핵 치료에 사용됩니다.

결핵균은 매우 강하여 퇴치하기가 어렵습니다. 결핵 박테리아를 완전히 살균하여 결핵을 치유하기 위해서는 에탐부톨을 2 개월이나 그 이상 먹어야 합니다. 약의 정확한 복용 기간은 담당 의사가 결정합니다.

에탐부톨은 어떻게 복용합니까?

- 매일 빠짐없이 (경우에 따라서는 의사의 별도 지시에 따라) 약을 먹는 것이 매우 중요 합니다.
- 약 먹는 것을 중단하면 담당 의사에게 즉시 알려야 합니다.
- 약 먹는 것을 잊었을 때에는 기억하는 즉시 약을 먹어야 합니다. 그러나 2 회분을 한꺼번에 복용 해서는 안됩니다.
- 에탐부톨은 음식물과 함께 먹어도 좋고, 약만 먹어도 무방합니다.
- 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관 하십시오.
- 기왕에 먹고 있는 약이 있거나 새로 먹는 약이 있을 때에는 미리 담당 의사에게 알려야 합니다.

★ 에탐부톨은 담당 의사의 지시에 따라 하루 한번 이나 두 번 먹습니다.

★ 임신이나 모유수유 중일 때에는 에탐부톨을 복용을 시작하기 전에 미리 담당 의사와 의논해야 합니다.

어떠한 부작용에 대해 주의해야 합니까?

- 에탐부톨을 먹을 때에는 담당 의사의 규칙적인 검사를 받을 필요가 있습니다.
- 에탐부톨을 먹을 때 흔히 나타나는 부작용으로는:
 - 식욕감소
 - 소화장애
 - 피부 발진
- 아래와 같은 심각한 부작용이 한 가지라도 나타날 때에는 에탐부톨의 복용을 즉시 중단하고 담당 의사 에게 알려야 합니다.
 - 에탐부톨은 한쪽 눈이나 양쪽 눈에 시력 장애를 가져올 수 있습니다. 사물이 흐릿하게 보이거나 색이 다르게 느껴진다고 생각되면 즉시 담당 의사에게 알려야 합니다.
 - 에탐부톨을 2 개월 이상 먹을 때에는 눈검사를 받아야 합니다.

항결핵제 복용에 관한 도움말

- 매일 같은 시간에 약을 먹습니다. 예를 들어:
 - 잠자기 직전이나,
 - 아침에 일어난 직후.
- 일주일 단위 약통을 사용합니다.
- 약 복용 후 매번 달력에 표시합니다.
- 가족이나 친지에게 약 먹는 것을 상기시켜 줄 것을 부탁드립니다.
- 복약확인치료법(DOT)의 필요성을 고려합니다.

먹고 있는 약이나 결핵에 대한 자세한 문의는 담당 의사나 토론토시 보건국(전화: **416-338-7600**)으로 연락하여 주십시오.

전자우편: targettb@toronto.ca

웹 사이트: www.toronto.ca/health/tb_prevention