

이소니아지드(INH)

Isoniazid (INH)

Korean



항결핵 치료제 복용 안내

이소니아지드는 어떤 약입니까?

이소니아지드(INH)는 결핵 치료용 항생제로 두 가지 사용 방법이 있습니다:

1. 비활동성(잠복) 결핵의 선택적 치료
2. 결핵 치료 (다른 약과 병용하는 경우)

결핵균은 매우 강하여 퇴치하기가 어렵습니다. 결핵 박테리아를 완전히 살균하여 결핵을 치유하려면 이소니아지드를 6 개월에서 12 개월 먹어야 합니다. 약의 정확한 복용 기간은 담당 의사가 결정 합니다.

이소니아지드는 어떻게 복용합니까?

- 매일 빠짐없이 (경우에 따라서는 의사의 별도 지시에 의해) 약을 먹는 것이 매우 중요 합니다.
- 약 먹는 것을 중단하면 담당 의사에게 즉시 알려야 합니다.
- 약 먹는 것을 잊었을 경우에는 기억하는 즉시 먹어야 합니다. 그러나 2 회분을 한꺼번에 복용해서는 안됩니다.
- 기왕에 먹고 있는 약이 있거나 새로 먹는 약이 있을 경우, 담당 의사에게 미리 알려야 합니다.
- 빈속에 약을 먹는 것이 좋지만, 약을 먹고 속이 불편 한 경우에는 음식물과 함께 복용하십시오.
- 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관 하십시오.

이소니아지드를 먹고 있는 중에는 절대로 음주를 하면 안됩니다. 간에 손상을 입힐 수가 있습니다.

비타민 B₆(피리독신)를 함께 먹어야 할 필요가 있을 수도 있다는 것은 무슨 이유입니까?

비타민 B₆ 는 이소니아지드의 복용으로 발생할 수 있는 손가락이나 발가락이 저리거나 얼얼한 증세의 방지에 도움이 됩니다. 건강한 식단으로 비타민 B₆ 을 충분히 섭취하면 비타민 B₆ 를 따로 먹을 필요는 없습니다.

어떠한 부작용에 대해 주의해야 합니까?

- 이소니아지드를 먹어서 문제가 발생하는 환자는 드뭅니다.
- 이소니아지드를 먹을 때에는 담당 의사의 규칙적인 검사를 받을 필요가 있습니다.
- 이소니아지드를 먹을 때 흔히 나타나는 부작용으로는 :
 - 피부 발진
 - 식욕감소
- 아래와 같은 심각한 부작용이 한 가지라도 나타날 때에는 이소니아지드의 복용을 즉시 중단하고 담당 의사에게 알려야 합니다.
 - 구역질, 구토
 - 위경련, 위통
 - 심한 피곤감
 - 매우 짙은색의 소변
 - 손가락이나 발가락이 아프거나, 얼얼한 따끔한 느낌
 - 황달
 - 3일 이상 지속되는 발열

항결핵제 복용에 관한 도움말

- 매일 같은 시간에 약을 먹습니다. 예를 들어:
 - 잠자기 직전이나,
 - 아침에 일어난 직후.
- 일주일 단위 약통을 사용합니다.
- 약 복용 후 매번 달력에 표시합니다.
- 가족이나 친지에게 약 먹는 것을 상기시켜 줄 것을 부탁드립니다.
- 복약확인치료법(DOT)의 필요성을 고려합니다.

먹고 있는 약이나 결핵에 대한 자세한 문의는 담당 의사나 토론토시 보건국(전화: **416-338-7600**)으로 연락하여 주십시오.

전자우편: targettb@toronto.ca

웹 사이트: www.toronto.ca/health/tb_prevention

