

피라진아미드(PZA)

Pyrazinamide (PZA)

Korean



항결핵 치료제 복용 안내

피라진아미드는 어떤 약입니까?

피라진아미드(PZA)는 결핵 치료용 항생제로 두 가지 사용 방법이 있습니다:

1. 비활동성(잠복) 결핵의 선택적 치료
2. 결핵 치료 (다른 약과 함께 사용하는 경우)

결핵균은 매우 강하여 퇴치가 어렵습니다. 결핵 박테리아를 완전히 살균하여 결핵을 치유하기 위해서는 피라진아미드를 2 개월이나 그 이상 먹어야 합니다. 약의 정확한 복용 기간은 담당 의사가 결정합니다.

피라진아미드는 어떻게 복용합니까?

- 매일 빠짐없이 (경우에 따라서는 의사의 별도 지시에 의해) 약을 복용하는 것이 매우 중요합니다.
- 약 복용을 중단하면 즉시 담당 의사에게 알려야 합니다.
- 약 먹는 것을 잊었을 경우에는 기억하는 즉시 약을 먹어야 합니다. 그러나 2 회분을 한꺼번에 복용해서는 안됩니다.
- 빈속에 먹는 것이 좋지만, 약을 먹고 속이 불편할 때에는 음식물과 함께 복용하십시오.
- 기왕에 먹고 있는 약이 있거나 새로 먹는 약이 있을 경우에는 담당 의사에게 미리 알려야 합니다.
- 임신이나 모유수유를 하고있는 중일 때에는, 피라진아미드를 사용하기 전에 먼저 담당 의사와 의논해야 합니다.
- 이 약은 서늘하고 건조한 곳에 보관 하십시오.

피라진아미드를 먹고 있을 때 절대로 음주를 하면 안됩니다. 간을 손상시킬 수가 있습니다.

대부분의 환자의 경우 치료 기간 중 처음 두 달 동안만 피라진아미드를 복용합니다. 이 기간 중

의사의 처방에 따라 하루 한 번에서 세 번까지 복용합니다.

어떠한 부작용에 대해 주의해야 합니까?

- 피라진아미드를 먹어서 문제가 발생하는 환자는 드뭅니다.
- 피라진아미드를 먹고 있을 때에는 담당 의사의 규칙적인 검사를 받을 필요가 있습니다.
- 피라진아미드를 먹을 때 흔히 나타나는 부작용으로는:
 - 소화장애, 식욕감소
 - 관절통
 - 피부 발진
 - 태양광선에 대한 예민한 반응
- 아래와 같은 심각한 부작용이 한 가지라도 나타날 때에는 피라진아미드의 복용을 즉시 중단하고 담당 의사에게 알려야 합니다.
 - 심한 피곤 증세
 - 구역질, 구토
 - 위경련
 - 식욕감소
 - 황달
 - 매우 짙은 색의 소변
 - 3 일 이상 지속되는 발열

항결핵제 복용에 관한 도움말

- 매일 같은 시간에 약을 먹습니다. 예를 들어:
 - 자기 직전이나,
 - 아침에 일어난 직후.
- 일주일 단위 약통을 사용합니다.
- 약 복용 후 매번 달력에 표시합니다.
- 가족이나 친지에게 약 먹는 것을 상기시켜 줄 것을 부탁드립니다.
- 복약확인치료법(DOT)의 필요성을 고려합니다.

먹고 있는 약이나 결핵에 대한 자세한 문의는 담당 의사나 토론토시 보건국(전화: **416-338-7600**)으로 연락하여 주십시오.

전자우편: targettb@toronto.ca

웹 사이트: www.toronto.ca/health/tb_prevention

