

Etambutol (EMB) Portuguese



Guia do paciente em tratamento da tuberculose

O que é o Etambutol?

O Etambutol (EMB) é um antibiótico utilizado para curar a tuberculose, quando é tomado com outros medicamentos.

Os micróbios da tuberculose são muito resistentes e difíceis de tratar. Você terá que tomar este medicamento durante dois meses, ou mais, para que a bactéria da tuberculose seja destruída. O seu médico decidirá exactamente durante quantos meses terá que tomar o medicamento.

Como devo tomar este medicamento?

- É muito importante que tome o medicamento todos os dias, **ou** conforme indicado pelo seu médico
- **Informe o seu médico imediatamente se parar de tomar o medicamento**
- Se você se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que for possível, mas nunca tome duas doses ao mesmo tempo
- Pode tomar o medicamento com ou sem comida
- Deve guardar o Etambutol em lugar fresco e seco, mas não no frigorífico.
- Lembre-se de informar o seu médico acerca de quaisquer outros medicamentos que esteja tomando ou de qualquer outro novo medicamento que comece a tomar

* Este medicamento pode ser tomado uma ou duas vezes por dia, dependendo de como o seu médico tiver receitado.

* Se estiver grávida ou amamentando, fale com o seu médico antes de tomar este medicamento.

Quais são alguns efeitos secundários a que devo prestar atenção?

- Enquanto estiver tomando o Etambutol, vai precisar de ser vigiado pelo seu médico regularmente.
- **Alguns efeitos secundários comuns:**
 - Perda de apetite
 - Mal-estar no estômago
 - Vermelhidão ou comichão na pele
- **Contacte o seu médico se tiver algum dos seguintes efeitos secundários mais sérios**
 - O Etambutol poderá causar mudanças visuais num olho ou em ambos os olhos. Se tiver a vista turva ou notar alguma alteração em como vê as cores, contacte com o seu médico o mais depressa possível.
 - Se tomar este medicamento durante mais de dois meses, vai necessitar de fazer um exame aos olhos.

Algumas sugestões úteis para tomar medicamentos da tuberculose

- Tome os medicamentos à mesma hora todos os dias. Por exemplo:
 - Antes de se deitar
 - Assim que se levantar de manhã
- Utilize uma caixinha de organizar comprimidos para guardar os medicamentos que deve tomar durante a semana
- Marque num calendário, cada vez que tomar um comprimido
- Peça a uma pessoa de família ou amigo para fazer-lhe lembrar de tomar o medicamento
- Considere o método de Terapêutica Observada Directamente (DOT) (tomar o remédio administrado por uma enfermeira).

Se tiver quaisquer perguntas sobre os seus medicamentos ou sobre a tuberculose, contacte o seu médico ou a Toronto Public Health ligando para **416-338-7600**

E-mail: targettb@toronto.ca

Web site: www.toronto.ca/health/tb_prevention

