

Pyrazinamide (PZA)

Spanish



Guía del paciente para tomar medicamento contra la tuberculosis

¿Qué es Pyrazinamide?

Pyrazinamide (PZA) es un medicamento antibiótico utilizado para tratar la tuberculosis. Existen dos formas de utilizarlo:

1. Para tratar la tuberculosis inactiva (latente)
2. Para curar la enfermedad de la tuberculosis (cuando se toma con otros medicamentos)

Los gérmenes de la tuberculosis son muy fuertes y es difícil deshacerse de ellos. Usted tendrá que tomar este medicamento durante dos meses o más para matar las bacterias. Su médico decidirá exactamente cuántos meses tomará la medicina.

¿Cómo me tomo este medicamento?

- Es muy importante que se tome el medicamento cada día o según le indique su médico.
- **Informe a su médico inmediatamente si deja de tomar la medicina**
- Si se salta una dosis, tómese la lo más pronto posible, pero no se tome nunca dos dosis a la vez
- Intente tomarse el medicamento con el estómago vacío. Si le cae mal al estómago, tómese con comida
- Recuerde informar al médico sobre otros medicamentos que esté tomando o cualquier otro nuevo medicamento que empiece a tomar
- Si está embarazada o amamantando, hable con su médico antes de tomar este medicamento.
- Guarde el PZA en un lugar fresco y seco

NO tome alcohol mientras esté tomando este medicamento. Podría dañarse el hígado.

La mayoría de las personas se toman este medicamento sólo durante los dos primeros meses de tratamiento. Durante este tiempo es posible que haya que tomarlo una, dos o tres veces al día, dependiendo de lo que prescriba el médico.

¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios a los que debo estar atento?

- La mayoría de las personas no tienen problemas cuando toman PZA
- Su médico tendrá que vigilarlo regularmente mientras esté tomando PZA
- **Algunos efectos secundarios comunes son:**
 - Dolor de estómago/pérdida de apetito
 - Inflamación o dolor en las articulaciones
 - Erupción en la piel
 - Mayor sensibilidad al sol
- **Si tiene alguno de los siguientes efectos secundarios más graves, deje de tomar el medicamento y llame a su médico**
 - Fatiga/se siente muy cansado
 - Náusea/vómitos
 - Retorcijones en el estómago
 - Pérdida de apetito
 - Piel u ojos amarillentos
 - Orina muy oscura
 - Fiebre durante tres días o más

Consejos para tomar medicamentos contra la tuberculosis

- Tómese la medicina a la misma hora cada día, por ejemplo:
 - Antes de acostarse
 - Al levantarse por la mañana
- Use un recipiente para las pastillas de cada semana
- Marque cada día que se toma las pastillas en un calendario
- Pídale a un familiar o un amigo que se lo recuerde
- Considere la Terapia de observación directa (DOT, por sus siglas en inglés)

Si tiene alguna pregunta sobre sus medicinas o sobre la tuberculosis, sírvase comunicarse con su médico o con los Servicios de Salud Pública de Toronto en el **416-338-7600**

Correo electrónico: targettb@toronto.ca
Sitio Web: www.toronto.ca/health/tb_prevention

