

冠状病毒肺炎患者护理养育婴幼儿指南

- 基于现有信息，婴幼儿感染 2019 冠状病毒的风险并不比成年人高。
- 基于已经搜集到的有限的报告，婴幼儿感染冠状病毒后，其病症和病情复杂程度比成年人要轻微一些。
- 保护婴幼儿的最佳措施是采取所有可能的自我隔离防护措施，避免婴幼儿与冠状病毒接触。
- 在接触孩子之前，用肥皂清水洗手不少于 15 秒。
- 靠近孩子时，[戴好口罩](#)，掩盖口鼻。
- 如有可能，孩子睡觉的地方应和您的脸部保持 6 英尺以上的距离。
- 请身体健康的家人或朋友看护您的孩子。
- 如果您母乳喂养孩子，坚持在接触孩子前认真洗手，喂奶时戴好口罩。
- 如果您根据建议，决定用配方奶粉喂养孩子时：
 - 如有可能，请身体健康的朋友或家人喂养孩子；
 - 在准备配方奶喂养孩子时认真洗手，戴好口罩。
 - 奶瓶和设备认真[消毒](#)。接触洁净的奶瓶和设备前认真洗手。
 - 家中准备二至四个星期的配方奶粉用量。
 - 如果婴儿不足两个月，请使用浓缩液体奶或即食液体奶。
 - 家庭配置的配方奶营养不全，不建议使用。请参阅[婴儿配方奶](#)，了解详细信息。
- 经常接触的物品表面，要注意清洗消毒。

了解更多信息

浏览网页：[冠状病毒肺炎患者护理养育婴幼儿指南](#)，了解更多信息。

如需了解有关 2019 冠状病毒肺炎的更多信息，请浏览网页 www.toronto.ca/COVID19 或致电 416-338-7600。