



د کویډ-19 واکسین فایزر-بایونٹیک، مودرنا، استرازنیکا/کویشیلډ او جانسن

بیا کتل شوی په 30 سپتمبر 2021

له کویډ-19 څخه رامنځته کیدونکي خطرونه

کویډ-19 یوه ویروسي او تنفسي ناروغي ده چې په عمده توګه سږي زیانمنوي. هغه کسان چې ډیر عمر او یا روغتیايي ستونزې لري کیدی شي د کویډ-19 له امله سخت ناروغ شي. کویډ-19 کولی شي زړه، سږو او ماغزو ته هم زیان ورسوي. ددی ویروس اورمهاله علایم ستوماني، د نفس لنډوالی، په تمرکز کې ستونزه او د عضلاتو درد دي.

کویډ-19 په دوامدار ډول نورو ډولونو ته بدلون مومي. ددی ویروس ځینې ډولونه ډیر ژر او اسانه خپرېږي او د سختو ناروغيو لامل ګرځي.

واکسین څرنگه عمل کوي

کویډ-19 واکسین زموږ بدن ته هدایت ورکوي ترڅو هغه انتي باډي جوړه کړي چې د کویډ-19 په وړاندې زموږ د بدن حفاظت کوي. په کاناډا کې منظور شوي درې ګوني واکسینونه باید دوه ځله (دوه ډوزونه) واخیستل شي. جانسن (جانسن انډ جانسن) واکسین یوازې یو ځل اخیستل کېږي. دا واکسینونه په خپل ترکیب کې کویډ-19 ویروس نلري، نو ځکه په کویډ-19 ستاسو د اخته کیدو لامل نه کېږي.

د واکسین ګټې

د کویډ-19 واکسینونه چې په کاناډا کې منظور شوي دي، 12 نه تر 18 کلونو عمر لرونکو، حامله ښځو او هغو ښځو لپاره چې ماشوم ته شیدې ورکوي، همدارنگه ډیر عمر لرونکو کسانو او ټولو روغتیايي ستونزو لرونکو وګړو لپاره تطبیقېږي. دا واکسینونه په کویډ-19 د خلکو له اخته کیدو او همداراز د ویروس له خپریدني مخنیوی کوي. واکسین همدارنگه کولی شي کویډ-19 څخه رامنځته کیدونکو سختو ناروغيو څخه مخنیوی او د خلکو حفاظت وکړي. ددی ویروس په وړاندې حفاظت د واکسین د تطبیق له نیټې څخه دوه اوونۍ وروسته موده کې تامینېږي. هغه واکسینونه چې باید دوه ډوزونه واخیستل شي، د دویم ډوز له اخیستلو وروسته د 1-2 اوونيو موده کې خپل بشپړ اغیزمنتوب څرګندوي.

دا ټول واکسینونه د روغتیايي ستونزو لرونکو وګړو لپاره چې د زړه او سږي ناروغي، شکر، د وینې لوړ فشار ناروغي لري، خوندي او مصوون دي. دا واکسینونه همداراز آټو ایمیون لرونکو ناروغانو، د بدن کمزوري دفاعي سیستم لرونکو ناروغانو چې د بدن دفاعي سیستم یې د ناروغی او یا درملنې په پایله کې کمزوری شوی وي، خوندي او مصوون دی، خو ددی ډلې ناروغانو په منځ کې واکسین ډیر اغیزمن نه دی.

د کویډ-19 واکسین اخیستلو وروسته به په دې ویروس ستاسو د اخته کیدو امکان لږ وي نو مهمه ده ترڅو ترهغه دمه د عامې روغتیا لارښوونې او تدابیر تعقیب کړئ چې ډیر شمیر وګړي واکسین ترلاسه کوي. د واکسین د حفاظت د مودې اوږدوالي په اړه اوس مهال معلومات نشته. په راتلونکي کې به د واکسین د یو بل تقویه کوونکي ډوز سپارښتنه کېږي.

د واکسین ترکیبات او حساسیتونه

واکسین په خپل ترکیب کې غوړ یا غوړي لرونکي مواد، مالګه، قند او بافر یا محلولونه لري. د واکسین په ترکیب کې هګی، جلاتین (د خنځیر غوښه)، لیتیکس، ګلوتین، حفاظتي مواد، انتي بیټیک، او المونیم نشته. د کویډ-19 واکسین په وړاندې حساسیت ډیر لږ پېښیږي. حتی که چیرې تاسو د خوراكي موادو، دواګانو او چاپیریال سره حساسیت لرئ، د واکسین اخیستل خوندي او مصوون دی. که چیرې پولینیلین ګلایکول، ترومیمین، او یا پولی سوربیت سره حساسیت لرئ، د واکسین له اخیستلو مخکې له خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.

شدید حساسیت یا (انافیلکسس) ډیر لږ پېښیږي. د واکسین حساسیتي ګڼګڼ د علاج وړ او معمولا د لږې مودې لپاره وي. که چیرې تاسو د څا اخیستلو ستونزه لرئ او یا هم د مخ یا ستوني پړسوب لرئ، روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ.



واکسین کووید-19 فایزر-جایونتییک، مودرنا، استرازنیکا/کوویشیلد و جانسن

جانبی عوارض او خطرونه

نږدې 20 سلنه خلک جانبي عوارض لري. ډیری جانبي عوارض خفیف وي او له یوې نه تر درېیو ورځو موده کې له منځه ځي. په بدن کې د جانبي عوارضو رامنځته کیدل په دې معنی دی چې واکسین ستاسو د بدن محافظتي سیستم فعالوي.

معمول جانبي عوارض په لاندې ډول دي:

- د پوستکي سوروالی، د واکسین د تطبیق د ځای درد، خاریښ او
- د عضلاتو درد
- پرسوب
- تبه
- د سر درد
- ستومانتیا
- د مفصلونو درد
- د یخنی احساس
- کانګي او زړه بدی

مایوکارډیټیس او پیریکارډیټیس

- مایوکارډیټیس او پیریوکارډیټیس د زړه په بیلابیلو برخو کې یو ډول التهاب دی.
- **د کانډا د عامې روغتیا اداره** د واکسین له تطبیق وروسته د نویو ځوانانو او لویانو د وضعیت په اړه د رپوټونو څارنه کوي. ډیر شمیر پېښ شوي واقعات خفیف وو چې د دوا او استراحت په واسطه له منځه تللي دي.
- د واکسین له تطبیق وروسته د سینې درد، د ځا اخیستې ستونزې او د زده د ټکان په صورت کې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ.
- سره له دې هم د واکسین د اخیستلو او تطبیق سپارښتنه کيږي ځکه چې ګټې یې د ضرر په پرتله ډیرې زیاتې دي.

د ویروس ناقل واکسینونو (استرازنیکا، کوویشیلد، جانسن) له اخیستلو وروسته نادر جانبي عوارض

- په نادرو حالتونو کې د وینې لخته کیدو له ویروس ناقل واکسینونو سره ارتباط ښودل شوی دی. د واکسین له تطبیق څخه د 28-4 ورځو په موده کې د ساه د بندیدو، د سینې درد، د پښو پرسوب، د نس (معدې) نویو دردونو او یا لاپسي زیاتیدونکو دردونو، شدید سردرد او لاپسي زیاتیدونکي سردرد، د سترګو د لید کمزورتیا، (د واکسین د تطبیق له ناحیې پرته) د جلد پرمخ تورو داغونو د رامنځته کیدو په صورت کې، روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ.

د واکسین پروراندې ستاسو د بدن غبرګون او د 3 ورځو په موده کې ددې غبرګون د دوام په صورت کې خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسئ. د عامې روغتیا اداره رپوټ شوي جانبي عوارض ثبتوي ترڅو د واکسین د مصونیت په باب داد ترلاسه شي.

د واکسین په تطبیق کې خنډ

- که چیرې تبه یا د کووید-19 علایم لری، د علایمو له منځه تللو پورې د واکسین له اخیستلو ډډه وکړئ.
- که چیرې په کووید-19 اخته شخص سره مو نږدې اړیکه لرلې وي او له همدې امله له تاسو غوښتل شوي وي چې ځان قرنطین کړئ، هیله کيږي د واکسین د اخیستلو نیټه د قرنطین مودې بشپړیدو وروسته بل وخت ته پلان کړئ.

خپل فامیلی ډاکټر سره مشوره وکړئ

په لاندې حالتونو کې، د واکسین له اخیستلو مخکې خپل فامیلی ډاکټر یا د حساسیت متخصص سره مشوره وکړئ: که چیرې له داسې دواګانو څخه استفاده کوئ چې ستاسو د بدن دفاعي سیستم کمزوری کوي – کیدي شي چې تاسو خپلې دواګانې او واکسین په بیلو وختونو کې واخلي. که چیرې د کووید-19 د لومړي ډوز له اخیستلو وروسته مو حساسیت کړی وي. که چیرې د هر ډول واکسین له ترکیباتو سره حساسیت لری.

تل د خپل خان او نورو حفاظت وکړئ

ترهغه دمه چې ډیر شمیر خلک واکسین ترلاسه کوي، د عامې روغتیا تدابیر رعایت کړئ، ټولنیز واټن په پام کې ونیسئ، ماسک واغونډئ او که چیرې ناروغ یاست، په کور کې پاتې شئ ترڅو د کووید-19 او ددې ویروس نورو ډولونو په وړاندې حفاظت تامین شي.

د لازیاتو معلوماتو لپاره: خپل ډاکټر سره اړیکه ونیسی او یا هم toronto.ca/COVID19 ویب پاڼې ته مراجعه وکړی.

مأخذ: د واکسین د تطبیق ملي مشورتي کمیټه. د کوویډ-19 د واکسین د کارولو په اړه سپارښتنې.