

# بچوں/طلبہ کے لیے کووڈ-19 اسکریننگ



براہ کرم نگہداشت طفل/JK-12 اسکول کی سیٹنگ میں داخل ہونے سے پہلے مکمل کریں۔

تجدید شدہ 1 ستمبر 2021

1. کیا بچے/طالب علم کو درج ذیل میں سے کوئی نئی یا بدتر ہوتی علامت درپیش ہے؟\*\*



متلی، الٹی یا اسہال



ذائقہ یا بو گھٹ جانا یا ختم ہو جانا



سانس لینے میں پریشانی



کھانسی



بخار  $37.8^{\circ}\text{C}$  اور/یا کپکپی

• اگر بچے/طالب علم کو نگہداشت صحت فراہم کنندہ کی تشخیص کردہ صحت کی ایسی کیفیت لاحق ہے جس سے انہیں علامات درپیش ہوتی ہیں تو "نہیں" کو منتخب کریں۔ اگر علامت نئی، مختلف ہے، یا بگڑ رہی ہے تو "ہاں" کو منتخب کریں۔

نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے رابطہ کریں



یا

ٹیسٹ کروائیں



+

گھر پر رہیں اور خود کو آئسولیٹ کریں



اگر کسی بھی علامت کا جواب "ہاں" میں دیا:

ہاں

نہیں

2. کیا آپ کے گھرانے میں کسی کو کووڈ-19 کی ایک یا زائد علامات درپیش ہیں اور/یا علامات درپیش ہونے کے بعد ٹیسٹ کے نتائج کا انتظار ہے؟

• اگر بچے کو پوری طرح سے ٹیکہ لگ گیا ہے\* یا پچھلے 90 دنوں میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے تو، "نہیں" کو منتخب کریں۔

ہاں

نہیں

3. پچھلے 10 دنوں میں، کیا بچے/طالب علم کا ریپڈ اینٹی جین ٹیسٹ یا گھر پر مبنی سیلف ٹیسٹنگ کٹ پر مثبت ٹیسٹ آیا ہے؟

• اگر اس کے بعد سے لیب پر مبنی PCR ٹیسٹ میں ان کا منفی ٹیسٹ آیا ہے تو "نہیں" کو منتخب کریں۔

ہاں

نہیں

4. کیا طالب علم/بچے کو کووڈ-19 والے کسی فرد کے قریبی رابطہ کے بطور مطلع کیا گیا ہے یا اسے گھر پر رہنے اور خود کو آئسولیٹ کرنے کو کہا گیا ہے؟

• اگر بچے کو پوری طرح سے ٹیکہ لگ گیا ہے\* یا پچھلے 90 دنوں میں کووڈ-19 کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور کلیئرنس مل گیا ہے یا صحت عامہ نے کہا کہ بچے/طالب علم کو خود کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو، "نہیں" کو منتخب کریں۔

ہاں

نہیں

5. پچھلے 14 دنوں میں، کیا بچے/طالب علم نے کینیڈا سے باہر کا سفر کیا ہے اور کورنٹین کے وفاقی تقاضے کے مطابق کورنٹین کرنے کو کہا دیا گیا ہے؟

صحت عامہ کے مشورے پر عمل کریں



+

گھر پر رہیں اور خود کو آئسولیٹ کریں



اگر سوال 2، 3، 4 یا 5 کا جواب "ہاں" میں دیا:

\* پوری طرح سے ٹیکہ لگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دو خوراک والے ٹیکے کی سیریز کی دوسری خوراک یا واحد خوراک والی سیریز کی ایک خوراک لینے کے بعد 14 دن یا زائد گزر گئے ہوں۔  
\*\* جو بھی کوئی فرد بیمار ہے یا اسے بیماری کی کوئی علامت درپیش ہے اسے چاہیے کہ گھر پر رہے اور اگر ضرورت ہو تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے تشخیص کروانے۔

