

سکریننگ یا معاینه اطفال/شاگردان برای کووید-19



لطفاً قبل از داخل شدن به تعمیر کودکستان/مکتب JK-12 این را تکمیل نمایید.

تجدید شده به 1 سپتمبر 2021

1. آیا طفل/شاگرد یکی از علائم جدید یا در حال بدتر شدن ذیل را دارد؟**



دلبدی، استفراغ یا اسهال



کاهش یا از دست دادن طعم و یا بو



مشکل تنفسی



سرفه



تب بالاتر از 37.8 درجه سانتی گرید و/یا لرز


• اگر طفل/شاگرد مشکل موجوده صحی دارند که داکتر آنها تثبیت نموده است و علائم موجوده از همین مشکل صحی ناشی شده باشد، پاسخ "نخیر" را نشانی کنید. اما اگر مشکل شان جدید، متفاوت بوده یا در حال بدتر شدن باشد پاسخ "بلی" را نشانی کنید.

با یک ارائه دهنده خدمات طبی تماس بگیرید



یا

معاینات خویشرا تکمیل کنید



+

در خانه بمانید و خودرا منزوی نمایید



اگر جواب به کدام یکی از علائم "بلی" است:

2. آیا کسی در خانواده شما یک یا چند مورد از علائم فوق را دارد و/یا پس از تجربه کردن علائم منتظر نتایج معاینات است؟

- بلی
 نخیر

• اگر طفل/شاگرد کاملاً واکسین شده است* ویا اگر معاینات کووید-19 در 90 روز گذشته مثبت بوده و اجازه گشت و گذار دریافت نموده است، پاسخ "نخیر" را انتخاب نمایید.

3. آیا در 10 روز گذشته نتیجه معاینات سریع یا (rapid antigen) و یا معاینات خودی طفل/شاگرد شما که در خانه انجام شده، مثبت بوده است؟

- بلی
 نخیر

• اگر نتیجه معاینات لابراتواری PCR آنها منفی است، پاسخ "نخیر" را انتخاب نمایید.

4. آیا به طفل/شاگرد بعنوان یک تماس نزدیک با یک فرد مبتلا به کووید-19- اطلاع داده شده است یا به او گفته شده است که در خانه بماند و خود را منزوی کند؟

- بلی
 نخیر

• اگر طفل/شاگرد کاملاً واکسین شده است* ویا اگر معاینات کووید-19 در 90 روز گذشته مثبت بوده و اجازه گشت و گذار دریافت نموده، و یا هم اگر اداره صحت عامه قرنطین طفل/شاگرد را توصیه نموده است، پاسخ "نخیر" را انتخاب نمایید.

5. آیا طفل/شاگرد در 14 روز گذشته، به خارج از کانادا سفر نموده است و طبق شرایط فدرال برای قرنطین از او خواسته شده است تا خود را قرنطین کند؟

- بلی
 نخیر

مشوره های اداره صحت عامه را تعقیب نمایید



+

در خانه بمانید و خود را قرنطین نمایید



اگر پاسخ به سوالات شماره 2، 3، 4 یا 5 "بلی" است:

* شخص کاملاً واکسین شده شخص است که 14 روز قبل یا بیشتر از آن، دوز دوم واکسین کووید-19 را که دو دوز گرفته میشود و یا دوز اول واکسین کووید-19 را که صرف یکبار تطبیق میشود، گرفته باشد.



**کسانی که احساس مریضی میکنند و یا هرگونه علائم دارند باید در خانه بمانند و در صورت ضرورت، از ارائه دهنده خدمات طبی خویش کمک بخواهند.