



COVID-19 Screening per bambini/studenti

Si prega di completare prima di entrare all'asilo/scuola primaria (JK-12).

Aggiornato al 1° settembre 2021

1. Il bambino/studente ha uno dei seguenti sintomi nuovi o in stato di peggioramento?***



Febbre >37.8°C
e/o brividi



Tosse



Difficoltà di
respirazione



Diminuzione o perdita di
gusto e dell'olfatto



Nausea, vomito o
diarrea

- Se il bambino/studente ha una condizione di salute diagnosticata da un medico che gli procura gli stessi sintomi, selezionare "No". Se il sintomo è nuovo, diverso o sta peggiorando, selezionare "Sì".

Se la risposta a qualsiasi di questi sintomi è "Sì":



Rimanere a casa in isolamento



Fare il test

Oppure



Contattare un operatore sanitario

2. C'è qualcuno in famiglia che ha uno o più dei sintomi del COVID-19 e/o sta aspettando i risultati del test dopo aver avuto i sintomi?

Sì

No

- Se il bambino/studente è completamente vaccinato* o è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 90 giorni ed è stato dimesso, selezionare "No."

3. Negli ultimi 10 giorni, il bambino/studente è risultato positivo ad un test rapido antigenico o ad un kit di test a domicilio?

Sì

No

- Se nel frattempo è risultato negativo a un test PCR di laboratorio, selezionare "No."

4. Il bambino/studente è stato notificato come contatto stretto di qualcuno con COVID-19 o gli è stato detto di rimanere a casa e auto-isolarsi?

Sì

No

- Se il bambino/studente è completamente vaccinato* o è risultato positivo al COVID-19 negli ultimi 90 giorni ed è stato dimesso o la sanità pubblica ha confermato che il bambino/studente non deve auto-isolarsi, selezionare "No."

5. Negli ultimi 14 giorni, il bambino/studente ha viaggiato fuori dal Canada E gli è stato consigliato di mettersi in quarantena secondo i [requisiti federali di quarantena](#)?

Sì

No

Se la risposta alle domande 2, 3, 4 o 5 è "Sì":



Rimanere a casa in isolamento



Seguire i consigli della sanità pubblica



* Completamente vaccinato significa che sono passati 14 giorni o più dopo aver ricevuto la seconda dose di una serie di vaccini a due dosi, oppure una dose di un vaccino a dose singola.

**Chiunque sia malato o abbia qualsiasi sintomo della malattia dovrebbe rimanere a casa e farsi controllare dal proprio operatore sanitario, se necessario.