

مراقبت از یک طفل که به کووید-19 مبتلا باشد



Feb 15, 2022

اگر یک طفل در خانواده تان به کووید-19 مبتلا باشد، والدین و مراقب کنندگان باید به مراقبت و حمایت برای نیازهای روزانه اطفال شان ادامه دهند. بیشتر اطفال نسبت به بزرگسالان علائم خفیف کووید-19 را دارند. برخی از اطفال مبتلا به کووید-19 ممکن است بسیار مریض شوند، ممکن است نیاز به انتقال به شفاخانه داشته باشند یا ممکن است علائم جدی تر و طولانی تری داشته باشند.

اگر طفل تان یکی از موارد ذیل را داشته باشد، خواستار مراقبت های صحن شوید:

از خواب بیدار نشود



کمتر از 3 ماه عمر داشته و دارای تب یا مشکل تنفسی باشد



تب همراه با علائم جلدی



تب که بیش از 7 روز طول بکشد



استفراغ یا اسهال مداوم



رنگ پوست مایل به آبی



سیستم معافیتی بدن اش متاثر شده و تب داشته باشد



مایعات کافی ننوشد



با موارد ذیل از گسترش بیشتر کووید-19 جلوگیری کنید:

تعقیم وسایلی که زیاد لمس میشوند مانند ظروف، وسایل، میزها، شیردهن نل ها، دستگیر دروازه ها و دستگیر دروازه تشناب ها.



پوشیدن ماسک مناسب در داخل خانه.



نخوابیدن در یک تختخواب با طفل تان.



تا حد امکان، قرنطین نمودن سایر اعضای خانواده که در معرض خطر بالای مریضی جدی ناشی از کووید-19 هستند.



تا حد امکان، مراعات کردن فاصله شش فوت یا دو متر از سایر اعضای خانواده.



شستن دست ها با آب و صابون.



همه اعضای خانواده باید در جریان قرنطین در خانه بمانند.



افزایش جریان هوا با باز کردن کلکین ها در صورتیکه مصئون باشد.



کمک به اطفال ما برای واکسین شدن مهمترین کاری است که در حال حاضر میتوانیم برای محافظت از اطفال، خانواده و اجتماع خود در برابر کووید-19 انجام دهیم.