

رعاية الطفل المصاب بكوفيد-19



15 فبراير/شباط 2022

إن كان أحد الأطفال في أسرتك **مصاباً بكوفيد-19**، فعلى الوالدين ومقدمي الرعاية الاستمرار بتوفير الرعاية والدعم لاحتياجاته اليومية. أعراض كوفيد-19 عند معظم الأطفال أخف منها لدى البالغين. يمكن أن يُصاب بعض الأطفال المصابين بكوفيد-19 بمرض شديد، أو قد يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفى، أو قد يُصابون بأعراض أشد خطورة وأطول أمداً.

التمس الرعاية الطبية إن كان أي مما يلي ينطبق على طفلك:

لا يستيقظ



عمره أقل من 3 شهور ويعاني من حمى أو صعوبة في التنفس



لديه حمى مع طفح جلدي



لديه حمى مستمرة لأكثر من 7 أيام



يعاني من إقياء أو إسهال مستمر



يعاني من ازرقاق لون الجلد



لديه نقص مناعة ويعاني من حمى



لا يشرب ما يكفي من السوائل



امنع زيادة انتشار كوفيد-19 عن طريق:

تعقيم الأغراض التي تُلمس كثيراً مثل الصحن والأواني والطاولات والصنابير ومقابض الأبواب ومقابض المراحيض



ارتداء **كمامة حجمها مناسب للوجه** داخل المنزل



عدم النوم في نفس السرير الذي ينام فيه طفلك



الانعزال قدر الإمكان عن أفراد العائلة المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19



الحفاظ قدر الإمكان على مسافة ستة أقدام/مترين عن جميع أفراد الأسرة الآخرين؛



غسل اليدين بالماء والصابون



يجب على جميع **أفراد الأسرة** البقاء في المنزل خلال نفس فترة العزل



زيادة جريان الهواء عن طريق فتح النوافذ إن كان ذلك آمناً



مساعدة أطفالنا على **تلقي اللقاح** هو أهم ما يمكننا فعله حالياً لحمايتهم وحماية أسرنا ومجتمعنا المحلي من كوفيد-19.