



Vakcíny proti COVID-19: Janssen (Johnson & Johnson)

Vakcíny proti COVID-19 chrání lidi před nákazou a šířením COVID-19. Chrání rovněž před vážným průběhem onemocnění COVID-19. Úřad Health Canada (ministerstvo zdravotnictví Kanady) schválil [čtyři vakcíny proti COVID-19](#): Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a [Janssen \(Johnson & Johnson\)](#). Tyto vakcíny neobsahují virus COVID-19 a nemůžete z nich COVID-19 dostat.

Doporučují se mRNA vakcíny

Vakcíny Pfizer-BioNTech a Moderna jsou vakcíny typu „[messenger RNA](#)“ nebo „[mRNA](#)“. Po dvou dávkách poskytují dobrou ochranu před vážným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím na COVID-19, včetně variant. mRNA vakcíny se doporučují, protože jsou bezpečnější a účinnější než vakcíny Janssen a AstraZeneca.

Vakcína Janssen (Johnson & Johnson)

Vakcína Janssen je „[virová vektorová](#)“ vakcína schválená pro osoby starší 18 let. Tato vakcína vyžaduje na začátku jednu dávku s doporučenou posilovací dávkou. Tato vakcína nemusí poskytovat dostatečnou ochranu proti novým variantám, včetně varianty omikron.

Po podání vakcíny Janssen se doporučuje posilovací dávka vakcíny mRNA. Posilovací dávky lze podat 3 měsíce nebo déle po první vakcíně.

Ve vzácných případech se u lidí, kteří dostanou vakcínu Janssen, může vyvinout:

- imunitní trombotická trombocytopenie vyvolaná vakcínou (VITT – krevní sraženiny s nízkým počtem krevních destiček)
- syndrom kapilárního úniku (únik tekutiny z malých krevních cév)
- Guillain-Barrého syndrom (imunitní systém těla napadá a poškozuje nervy)
- imunitní trombocytopenie (nízký počet krevních destiček – buněk, které pomáhají zastavit krvácení)
- žilní tromboembolismus (krevní sraženiny v hlubokých žilách)

Pokud se některé příznaky objeví během prvního měsíce po očkování, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Příznaky zahrnují: silnou bolest hlavy, která neustupuje; záchvaty; rozmazané nebo dvojité vidění; dušnost; silnou bolest na hrudi, zádech nebo břiše; otok nebo bolest paží nebo nohou; neobvyklé krvácení, modřiny nebo drobné kulaté skvrny pod kůží mimo místo vakcinace.

Jak získat vakcínu Janssen

Vakcína Janssen je k dispozici na imunizačních klinikách města Toronta pro osoby ve věku 18 let a starší, které:

- nemohou dostat mRNA vakcínu; nebo,
- po rozhovoru se svým lékařem nechtějí vakcínu mRNA.



Chcete-li dostat vakcínu Janssen, váš lékař **musí** poslat doporučení úřadu Toronto Public Health. Poté budete kontaktováni, abyste si zarezervovali schůzku na [klinice města Toronto](#). **Návštěvy bez objednání nejsou akceptovány.**

Pro více informací:

- [Kompletní informační leták ohledně vakcíny Janssen](#) (Ministerstvo zdravotnictví Ontaria)
- [Aktualizace ohledně virových vektorových vakcín](#) (Toronto Public Health – Úřad pro veřejné zdraví)