



د کویډ-۱۹ واکسینونه - هغه ماشومان چې د ۵ څخه تر ۱۱ کلونو پورې عمر ولري  
د ۲۰۲۲ کال د مې ۱۲ مه

### ماشومان او کویډ-۱۹

کویډ-۱۹ یو ویروسي انتان یا اینفیکشن دی چې زیاتره په سرو اغیزه کوي. اکثره ماشومان چې کویډ-۱۹ لري، نښې یې معتدلې وي. ځینې ماشومان ډېر ناروغه کېدای شي او ښایي په روغتون کې بستر کېدو ته اړتیا ولري او یا د اوږدې مودې نښې ورته پیدا شي د ستړیا احساس، تنفسي ستونځه، د تمرکز ستونځه یا د عضلاتو دردونو په ګډون.

د ماشومانو واکسین کول دوی د کویډ-۱۹ د ښو د جدي ناروغیو څخه ساتي. څومره ډېر ماشومان چې واکسین شي، په هماغه اندازه به ښوونځي، سپورتونه او نور فعالیتونه خوندي وي.

### د ماشومانو لپاره د کویډ-۱۹ واکسینونه

ماشومان باید د واکسین کولو په وخت کې د ۵ کاله او یا ډېر عمر ولري. د کاناډا د روغتیا وزارت د ایم - این - آر - ای تصویب شوي واکسینونه د ماشومانو لپاره د پیدیاټریک فایزر - بایو اینټیک (د ۵ څخه تر ۱۱ کلنو پورې) او موډرنا سپایکوکس (د ۶ څخه تر ۱۱ کلنو لپاره) دي.

### د ماشومانو لپاره د ایم - این - آر - ای واکسینونه په لاندې ډول دي:

- خوندي او اغېزمن، د هغو ماشومانو په ګډون چې یوه روغتیايي ستونځه لري، لکه حساسیت، ساه بندي، شکرې یا د معافیت سیستم کمزوري.
  - په احتیاط سره څارل شوي او په ټوله نړۍ کې د پیدیاټریک فایزر واکسین ملیونونو ډوزونه ورکول شوي دي.
  - د ۱۲ کلنو او د هغه څخه پورته عمر لرونکو کسانو ته کوچنی ډوز.
- د ماشومانو د فایزر - بایو اینټیک په دې عمر ګروپ کې غوره واکسین دی. د هغه ماشوم لپاره چې د معافیت سیستم یې خورا کمزوری وي، د موډرنا واکسین په پام کې نیول کېدی شي.

### واکسین څنګه کار کوي

- د ایم - این - آر - ای واکسینونه زمونږ د معافیت سیستم ته د انټي باډیز د جوړولو ښوونه کوي چې مونږ د کویډ-۱۹ څخه وساتي.
- دا واکسینونه د کویډ-۱۹ ویروس نلري، نو ستاسو ماشوم نشي کولای د واکسین څخه انفیکشن واخلي.

- د واکسين هر ډوز وروسته، لږ تر لږه دوه اونۍ وخت نيسي چې خونديتوب تر لاسه شي.
- د بشپړ خونديتوب لپاره د واکسين دوه ډوزونو ته اړتيا ده. هغه ماشومان چې د معافيت سيستم يې خورا کمزوری وي بايد درې ډوزونه واخلي.
- د ډوزونو تر مينځ د اته اونۍ وخت سپارښتنه کيږي.

### د واکسين اجزا او حساسيت

د ايم - اين - آر - اي په واکسينونه کې ليدونې (وازي)، مالګې، بورې او بفر (عضوي محلول) گډ دي. په دوي کې هګي، جيلاتين (خنزير)، گلوتين (نشايسته)، ليتيکس (شيره)، ساتونکي توکي، انټي بيوتيکونه، يا المونيم گډ نه دي. دا واکسينونه د هغو ماشومانو لپاره خوندي دي چې خواړو، درمل يا د چاپيريال سره حساسيت لري. د روغتيايي پاملرنې وړاندي کونکي سره خبرې وکړئ که ستاسو ماشوم د پوليتيلين گلايکول (د قبضيت دوا) سره حساسيت ولري. د حساسيت غبرگونونه د جدي غبرگونونو (انافيلیکسس) په گډون، ډير کم دي. د حساسيت غبرگون درملنه کېدای شي او معمولاً لنډمهاله وي. که ستاسو ماشوم په ساه اختلوکې ستونځه ولري، يا په مخ او ستوني کې پرسوب يا د پوستکي بخار پيدا کړي، طبي مرسته ترلاسه کړئ.

### اړخيزه اغيزې او خطرونه

اړخيزه اغيزې په ماشومانو، ځوانانو او لويانو کې ورته دي. دا اغيزې معمولاً معتدلې وي، او له يوه څخه تر دريو ورځو پورې دوام کوي. اړخيزه اغيزې معمولاً پدې معنی دي چې واکسين کار کوي.

عام اړخيزې اغيزې کې دا لاندې گډ دي:

- سوړوالی، پرسوب يا درد چيرته چې واکسين ورکړل شوی
- د سر درد
- ټوخی او يا کانګې
- د سترپا احساس
- د بندونو درد او يا د عضلاتو درد
- ساړو له کبله ريږدېدنه او يا تبه

که ستاسو ماشوم لوړه تبه ولري (د ۴۰ درجې سانتي گراد څخه ډېر) يا د واکسين کولو وروسته له دريو ورځو څخه ډېر اړخيزې اغيزې ولري طبي پاملرنه ترلاسه کړئ.

### مايکروډيټيس او پيريکريډيټيس Myocarditis and Pericarditis

کېدای شي مایکروډيټيس او پيريکريډيټيس (د زړه د التهاب ډولونه) د کويډ-۱۹ له انفیکشن وروسته منځ ته راشي او کېدای شي جدي وي. په نادره مواردو کې، دا د واکسين کولو وروسته منځ ته راتلای شي مگر دا معتدل وي او معمولاً په څو ورځو کې ښه کيږي. که ستاسو ماشوم ته د واکسين کولو څخه څو اونۍ وروسته د سينې درد، ساه لنډي، يا د زړه ضريان زياتېدل پېښ شي، طبي پاملرنه ترلاسه کړئ. د واکسين کولو لاهم سپارښتنه کيږي ځکه چې گټې يې له هر خطر څخه ډيرې دي.

### د واکسين کولو لپاره انتظار وکړئ

- هغه ماشومان چې تبه ولري يا د کويډ-۱۹ نښې ولري بايد تر هغه پورې انتظار وکړي چې دوی ښه شي. په دې اړه ځان وپوهئ چې [کله په کويډ-۱۹ د اخته کېدو وروسته واکسين وشي](#).
- هغه ماشومان چې ځان جلا کولو (انزوا) ته اړتيا لري بايد انتظار وکړي تر څو چې د دوی د جلا کېدو موده پای ته ورسېږي.

## د روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره مشوره وکړئ که ستاسو ماشوم:

- هغه درمل اخلي چې د دوی د معافیت سیستم کمزوری کوي - تاسو ښایي د دوی د درملو سره په ورته وخت کې واکسین وکړئ
- د کوید-۱۹ واکسین د لومړي ډوز ترلاسه کولو څلور ساعته وروسته د حساسیت غبرگون درلود.
- د واکسین له هر ډول اجزاوو سره سخت حساسیت لري.
- د ملي سیستم التهایي سنډروم درلود.

## د واکسین کولو لپاره د پوهاوي رضایت

د ۵ څخه تر ۱۱ کلنو ماشومانو ته د واکسین ورکولو لپاره د والدین یا ساتونکي رضایت ته اړتیا شته.

د **نورو معلوماتو لپاره:** د خپل روغتیا پاملرنې وړاندې کونکي سره خبرې وکړئ او [Toronto.ca/COVID19](https://toronto.ca/COVID19) څخه لیدنه وکړئ