



Vakcíny proti COVID-19: Janssen (Johnson & Johnson)

Vakcíny proti COVID-19 chránia ľudí pred nákazou a šírením COVID-19. Chráni aj pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19. Úrad Health Canada (ministerstvo zdravotníctva Kanady) schválil [štyri vakcíny proti COVID-19](#): Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca a [Janssen \(Johnson & Johnson\)](#). Tieto vakcíny neobsahujú vírus COVID-19 a nemôžete z nich COVID-19 dostať.

Odporúčajú sa mRNA vakcíny

Vakcíny Pfizer-BioNTech a Moderna sú vakcíny typu „[messenger RNA](#)“ alebo „[mRNA](#)“. Po dvoch dávkach poskytujú dobrú ochranu pred vážnym priebehom ochorenia, hospitalizáciou a úmrtím na COVID-19, vrátane variantov. mRNA vakcíny sa odporúčajú, pretože sú bezpečnejšie a účinnejšie ako vakcíny Janssen a AstraZeneca.

Vakcína Janssen (Johnson & Johnson)

Vakcína Janssen je „[vírusová vektorová](#)“ vakcína schválená pre osoby staršie ako 18 rokov. Táto očkovač látka vyžaduje na začiatku jednu dávku s odporúčanou posilňovacou dávkou. Táto vakcína nemusí poskytovať dostatočnú ochranu proti novým variantom, vrátane variantu omikrón.

Po podaní očkovačej látky Janssen sa odporúča posilňovacia dávka očkovačej látky mRNA. Posilňovacie dávky možno podať 3 mesiace alebo dlhšie po prvej vakcíne.

V zriedkavých prípadoch sa u ľudí, ktorí dostanú vakcínu Janssen, môže vyvinúť:

- imunitná trombotická trombocytopenia vyvolaná vakcínou (VITT – krvné zrazeniny s nízkym počtom krvných doštičiek)
- syndróm kapilárneho úniku (únik tekutiny z malých krvných ciev)
- Guillain-Barrého syndróm (imunitný systém tela napadá a poškodzuje nervy)
- imunitná trombocytopenia (nízky počet krvných doštičiek – buniek, ktoré pomáhajú zastaviť krvácanie)
- žilový tromboembolizmus (krvné zrazeniny v hlbokých žilách)

Ak sa niektoré príznaky objavia počas prvého mesiaca po očkovaní, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Príznaky zahŕňajú: silnú bolesť hlavy, ktorá neustupuje; záchvaty; rozmazané alebo dvojité videnie; dýchavičnosť; silnú bolesť na hrudi, chrbte alebo bruchu; opuch alebo bolesť paží alebo nôh; neobvyklé krvácanie, modriny alebo drobné okrúhle škvrny pod kožou mimo miesta vakcinácie.

Ako dostať vakcínu Janssen

Vakcína Janssen je k dispozícii v imunizačných klinikách mesta Toronta pre osoby vo veku 18 rokov a staršie, ktoré:

- nemôžu dostať mRNA vakcínu; alebo,
- po rozhovore so svojím lekárom nechcú vakcínu mRNA.



Ak chcete dostať vakcínu Janssen, váš lekár **musí** poslať odporúčanie úradu Toronto Public Health. Potom budete kontaktovaní, aby ste si zarezervovali schôdzku na [klinike mesta Toronto](#).
Návštevy bez objednania nie sú akceptované.

Pre viac informácií:

- [Kompletný informačný leták týkajúci sa vakcíny Janssen](#) (Ministerstvo zdravotníctva Ontária)
- [Aktualizácia týkajúci sa vírusových vektorových vakcín](#) (Toronto Public Health – Úrad pre verejné zdravie)