



COVID-19 vakcinák: Janssen (Johnson & Johnson)

A COVID-19 elleni vakcinák megvédik az embereket attól, hogy megkapják és terjesszék a COVID-19-et. Attól is megvédenek, hogy a COVID-19 miatt valaki súlyosan megbetegedjen. A Health Canada eddig [négy COVID-19 elleni vakcinát](#) hagyott jóvá: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca és [Janssen \(Johnson & Johnson\)](#). Ezek a vakcinák nem tartalmazzák a COVID-19 vírust, így nem fertőzhetik meg COVID-19-cel.

Az mRNS vakcinák ajánlottak

A Pfizer-BioNTech és a Moderna vakcinák „[messenger RNS](#)” vagy „[mRNS](#)” alapú vakcinák. Két adag után jó védelmet nyújtanak a COVID-19 okozta súlyos megbetegedéssel, kórházi kezeléssel és elhalálozással szemben, beleértve azok változatokat is. Az mRNS vakcinák azért javasoltak, mert biztonságosabbak és hatékonyabbak, mint a Janssen- és az AstraZeneca-vakcinák.

Janssen (Johnson & Johnson) vakcina

A Janssen-vakcina egy 18 éves és idősebb személyek számára engedélyezett „[vírusvektor](#)” alapú vakcina. A vakcinából egy adag beadására van szükség, ami után az emlékeztető oltás javasolt. Előfordulhat, hogy ez a vakcina nem nyújt megfelelő védelmet az új variánsok, köztük az Omicron ellen. .

A Janssen-vakcina beadása után ajánlott egy mRNS alapú emlékeztető vakcina beadása. Az emlékeztető oltások három vagy több hónappal az első vakcina beadása után adhatók be.

Ritka esetekben a Janssen-vakcinát kapó személyeknél kialakulhatnak a következők:

- A vakcina által kiváltott immuntrombotikus trombocitopénia (VITT - alacsony vérlemezkesszámmal járó vérrögök)
- Kapilláris szivárgás szindróma (folyadék szivárgása hajszálerekből)
- Guillain-Barré-szindróma (a szervezet immunrendszere megtámadja és károsítja az idegeket)
- Immun trombocitopénia (alacsony vérlemezkesszám – olyan sejtek, amelyek segítenek elállítani a vérezést)
- Vénás tromboembólia (vérrögök a mélyvénákban)

Forduljon azonnal orvoshoz, ha bizonyos tünetek jelentkeznek az oltást követő első hónapban. A tünetek a következők: súlyos, nem múló fejfájás; görcsrohamok; homályos vagy kettős látás; légszomj; súlyos mellkasi, háti vagy hasi fájdalom; a karok vagy lábak duzzanata vagy fájdalma; szokatlan vérzés, véraláfutás vagy a bőr alatt a vakcinázás helyén kívüli apró, kerek foltok.

Hogyan juthat hozzá a Janssen-vakcinához?

A Janssen-vakcina Toronto immunizálási klinikáin kapható 18 éves és idősebb olyan személyek számára, akik:

- nem kaphatnak mRNS-vakcinát; vagy
- nem akarnak mRNS-vakcinát az orvossal való megbeszélés után.



A Janssen-vakcina beadásához kezelőorvosának beutalót **kell** küldenie a Torontói Közegészségügyi Hivatalba. Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy időpontot foglalhasson egy [torontói klinikán](#). **Önálló bejelentkezés nem fogadható el.**

További információért:

- [Teljes Janssen-vakcina információs adatlap](#) (Ontariói Egészségügyi Minisztérium)
- [Hírek a vírusvektor vakcinákról](#) (Torontói Közegészségügyi Hivatal)