



Szczepionka przeciw COVID-19

Novavax Nuvaxovid

22 kwietnia 2022

W lutym 2022 r. Ministerstwo Zdrowia Kanady zatwierdziło szczepionkę [Novavax Nuvaxovid](#) dla osób w wieku 18 lat lub starszych. Szczepionka ta jest przeznaczona dla osób, które nie są w stanie (np. z powodu alergii) lub nie chcą otrzymać innego rodzaju szczepionki przeciw COVID-19.

Jak działa szczepionka

[Novavax](#) to szczepionka białkowa, podjednostkowa. Wykorzystuje małe cząsteczki białka, aby nauczyć nasz układ odpornościowy wytwarzania przeciwciał, które rozpoznają i zwalczają COVID-19. Szczepionka nie zawiera wirusa COVID-19 i nie może wywołać infekcji.

Harmonogram szczepień

Wymagane są dwie dawki i zdecydowanie zalecana jest dawka przypominająca. Ochrona zaczyna się dwa tygodnie po szczepieniu. Za zgodą, Novavax może być podany jako dawka przypominająca, mimo że nie jest obecnie zatwierdzony jako szczepienie przypominające przez [Ministerstwo Zdrowia Kanady](#).

Mieszanie szczepionek

[Novavax](#) może być stosowany jako którakolwiek z pierwszych dwóch dawek lub jako dawka przypominająca, nawet jeśli poprzednia szczepionka była inna (np. jedna dawka innej szczepionki przeciw COVID-19 i jedna dawka [Novavax](#)).

Korzyści ze szczepień

Szczepionki przeciw COVID-19 typu [mRNA](#) (np. Pfizer-BioNTech i Moderna Spikevax) są preferowane, ponieważ zapewniają silniejszą ochronę przed poważną chorobą, hospitalizacją i zgonem z powodu COVID-19 włącznie z jego wariantami. Badania kliniczne wykazały skuteczne działanie [Novavax](#) w zapobieganiu zachorowania na COVID-19. Ochrona długoterminowa nie jest jeszcze znana. Nie wiemy również, jak skuteczny jest Novavax w przypadku osób, które mają słaby układ odpornościowy, cierpią na chorobę autoimmunologiczną, przeszły COVID-19 w przeszłości, lub są w ciąży lub karmią piersią.

Skutki uboczne i ryzyka

U niektórych osób po szczepieniu mogą wystąpić skutki uboczne – większość z nich jest łagodna do umiarkowanych i trwa od jednego do trzech dni. Skutki uboczne zwykle oznaczają, że szczepionka działa. Do najczęstszych skutków ubocznych należą zaczerwienienie, ból lub obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, stan podgorączkowy, ból głowy, uczucie zmęczenia, bóle mięśni, ból stawów, dreszcze, nudności i/lub wymioty.

W przypadku wystąpienia poważnej reakcji na szczepionkę lub jeśli reakcja nie ustąpi po 3 dniach, poinformuj o tym lekarza. Urząd ds. zdrowia publicznego prowadzi rejestr skutków ubocznych, aby zapewnić bezpieczeństwo szczepionek.



Szczepionka przeciw COVID-19

Novavax Nuvaxovid

Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdza to rodzaje zapalenia w różnych częściach serca. Może wystąpić po zachorowaniu na COVID-19 i może być poważne. Rzadko występuje po otrzymaniu szczepionki Novavax i jest ściśle monitorowane. W przypadku zachorowania większość przypadków ma łagodny przebieg i jest leczona farmakologicznie i odpoczynkiem a poprawa następuje w ciągu kilku dni.

Zasięgnij porady lekarskiej, jeśli po szczepieniu pojawi się ból w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu lub przyspieszone bicie serca. Szczepienie jest nadal zalecane, ponieważ jego korzyści przewyższają ryzyko.

Składniki szczepionek i alergie

Szczepionka zawiera polisorbát 80, sole, cukier i bufony. Nie zawiera jaj, żelatyny (wieprzowej), glutenu, lateksu, konserwantów, antybiotyków ani aluminium. W rzadkich przypadkach mogą wystąpić poważne reakcje alergiczne (anafilaksja). Reakcje alergiczne mogą być leczone i są na ogół krótkotrwałe. Zasięgnij porady lekarskiej w przypadku pojawienia się trudności w oddychaniu, pokrzywki lub obrzęku twarzy i szyi. Osoby, u których wystąpiła silna reakcja alergiczna na inną szczepionkę COVID-19 lub glikol polietylenowy (PEG) mogą rozważyć zaszczepienie się szczepionką [Novavax](#).

Przełóż szczepienie na później, jeżeli:

- Masz gorączkę lub jakiegokolwiek objawy COVID-19, zaczekaj, aż poczujesz się lepiej zanim się zaszczepisz.
- Musisz poddać się [samoizolacji](#), przełóż termin wizyty na późniejszą datę, po zakończeniu okresu izolacji.

Przed zaszczepieniem porozmawiaj z lekarzem, jeżeli:

- Jesteś w ciąży, możesz być w ciąży lub karmisz piersią
- Cierpisz na chorobę autoimmunologiczną
- Masz osłabiony układ odpornościowy z powodu choroby lub terapii
- W ciągu czterech godzin po podaniu pierwszej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wystąpiła u Ciebie reakcja alergiczna
- Masz silną alergię na jakikolwiek składnik szczepionki [Novavax](#), w tym alergię na polisorbát 80

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim lekarzem lub odwiedź naszą stronę internetową toronto.ca/COVID19.

Źródła

Krajowy Komitet Doradczy ds. Immunizacji. Oświadczenia i publikacje - COVID 19. Dostępne na stronie internetowej <https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html#covid-19>

Novavax, Inc. February 17, 2022. Product Monograph – Nuvaxovid. Dostępne na stronie internetowej <https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/nuvaxovid-pm-en.pdf>