



Novavaks Nuvaksovid vakcina protiv KOVIDA-19

22. april 2022. godine

U februaru 2022. godine, Zdravstvo Kanada (Health Canada) je odobrilo [Novavaks Nuvaksovid](#) vakcinu za osobe od 18 ili više godina starosti. Ova vakcina je za osobe koje ne mogu (na primer, zbog alergije) ili ne žele da prime drugu vrstu vakcine protiv KOVIDA-19.

Kako vakcina funkcioniše

[Novavaks](#) je vakcina proteinske podjedinice. Vakcina koristi male delove proteina kako bi naučila naš imuni sistem da proizvodi antitela koja prepoznaju i bore se protiv KOVIDA-19. Vakcina ne sadrži virus KOVIDA-19 i ne može Vas zaraziti.

Raspored za vakcinaciju

Potrebne su dve doze i buster doza se toplo preporučuje. Za zaštitu su potrebne dve nedelje nakon vakcinacije. Sa pristankom, Novavaks može biti data kao buster doza iako ona trenutno nije odobrena kao buster doza od [Zdravstva Kanade \(Health Canada\)](#).

Mešanje vakcina

[Novavaks](#) se može koristiti za bilo koju od prve dve doze ili kao buster, čak iako su prethodne vakcine bile drugačije (na primer, jedna doza od druge vakcine protiv KOVIDA-19 i jedna doza [Novavaks vakcine](#)).

Prednosti vakcine

[mRNA](#) vakcine protiv KOVIDA-19 (na primer Fajzer-BioNTek i Moderna Spikevaks) su poželjnije pošto pružaju snažniju zaštitu protiv ozbiljne bolesti, hospitalizacije i smrti od KOVIDA-19, uključujući i varijante. Klinička ispitivanja su pokazala da [Novavaks](#) funkcioniše dobro u sprečavanju zaraze od KOVIDA-19. Informacije o dugoročnoj zaštiti još nisu raspoložive. Takođe ne znamo koliko je efikasna Novavaks vakcina za osobe koje imaju oslabljen imuni sistem, autoimuni poremećaj ili stanje, osobe koje su imale KOVID-19 u prošlosti ili osobe koje su trudne ili doje.

Nuspojave i rizici

Neke osobe mogu imati neželjene efekte posle vakcinacije - većina su blagi ili umereni i traju od jednog do tri dana. Nuspojave uglavnom znače da vakcina deluje. Uobičajeni neželjeni efekti uključuju crvenilo, bol, ili otok na mestu injekcije, blagu temperaturu, glavobolju, osećanje umora, bol u mišićima, bol u zglobovima, drhtavicu, mučnina i/ili povraćanje.



Ako imate ozbiljnu reakciju na vakcinu ili ako reakcija ne prođe posle 3 dana, obavestite Vašeg zdravstvenog stručnjaka. Javno zdravstvo (Public Health) beleži nuspojave kako bi se osigurali da su vakcine i dalje bezbedne.



Novavaks Nuvaksovid vakcina protiv KOVIDA-19

Miokarditis i perikarditis su vrste zapaljenja u različitim delovima srca. Mogu se pojaviti posle oboljenja od KOVIDA-19 i mogu biti ozbiljni. To se retko desilo posle Novavaks vakcine i pomno se prati. Ako se to ipak dogodi, većina slučajeva je blaga i leči se lekovima i mirovanjem, i za par dana se poboljša.

Tražite medicinsku pomoć ako nakon vakcinacije dobijete bol u grudima, kratak dah ili ubrzan rad srca. Vakcinacija se i dalje preporučuje pošto je korist veća od rizika.

Sastojci vakcine i alergije

Vakcina sadrži polisorbitat 80, soli, šećere, i pufere. Ne sadrži jaja, želatin (svinjetinu), gluten, lateks, konzervanse, antibiotike ili aluminijum. U retkim slučajevima, može doći do ozbiljnih alergijskih reakcija (anafilaksija). Alergijske reakcije se mogu lečiti i uglavnom su privremene. Tražite medicinsku pomoć ako imate problema sa disanjem, dobijete koprivnjaču (osip) ili oticanje lica i grla.

Osobe sa ozbiljnom alergijskom reakcijom na drugu vakcinu protiv KOVIDA-19 ili na polietilen glikol (PEG) mogu razmisliti o primanju Novavaks vakcine.

Odložite vakcinaciju ako:

- Imate temperaturu ili ikakve simptome KOVIDA-19, sačekajte dok se ne budete osećali bolje pre no što se vakcinišete.
- Morate da se samoizolujete, molimo Vas da pomerite termin za kasniji datum, kada se završi Vaš period izolacije.

Razgovarajte sa Vašim zdravstvenim stručnjakom ako ste:

- Trudni, mislite da možete biti trudni ili ako dojite
- Imate autoimuni poremećaj/stanje
- Imate oslabljeni imuni sistem zbog bolesti ili lečenja
- Imali alergijsku reakciju unutar četiri sata nakon dobijanja prve doze vakcine protiv KOVIDA-19
- Imate ozbiljnu alergiju na bilo koje sastojke [Novavaks](#) vakcine, uključujući alergiju na polisorbitat 80

Za dodatne informacije, pričajte sa Vašim zdravstvenim stručnjakom ili posetite našu internet stranicu toronto.ca/COVID19.

Izvori

Nacionalni savetodavni komitet za imunizaciju. Izjave i publikacije - KOVID 19. Na raspolaganju na <https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html#covid-19>



Novavax, Inc. 17. februar 2022. godine Proizvod Monografija - Nuvaksovid. Na raspolaganju na <https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/nuvaxovid-pm-en.pdf>