



Вакцина от COVID-19 Novavax Nuvaxovid

22 апреля 2022 г.

В феврале 2022 года Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину [Novavax Nuvaxovid](#) для людей в возрасте от 18 лет. Эта вакцина подходит для тех, кто не может (например, из-за аллергии) или не хочет вакцинироваться другим типом вакцины от COVID-19.

Как работает вакцина

[Novavax](#) — это белковая субъединичная вакцина. Она использует небольшие частички белка, чтобы научить нашу иммунную систему создавать антитела, которые распознают COVID-19 и борются с ним. Вакцина не содержит вируса COVID-19 и не может инфицировать Вас.

График вакцинации

Требуется две дозы, настоятельно рекомендуется использовать бустер. Для достижения полноценной защиты после вакцинации должно пройти две недели. При наличии согласия вакцина Novavax может быть предоставлена в качестве бустера, несмотря на то, что [Министерство здравоохранения Канады](#) на данный момент не авторизовало её использование в качестве бустера.

Комбинированное использование вакцин

[Novavax](#) может использоваться в любой из первых двух доз или в качестве бустера, даже если предыдущая вакцина была другой (например, одна доза другой вакцины от COVID-19 и одна доза [Novavax](#)).

Преимущества вакцины

Вакцины [mRNA](#) от COVID-19 (например Pfizer-BioNTech и Moderna Spikevax) предпочтительны, потому что они обеспечивают более надёжную защиту от серьёзных заболеваний, госпитализации и смерти от COVID-19, включая варианты. Клинические испытания показали, что [Novavax](#) хорошо предотвращает неприятные или тяжёлые симптомы при заражении COVID-19. Данных по долгосрочной защите пока нет. Мы также не знаем, насколько эффективна вакцина Novavax для людей, которые имеют слабую иммунную систему, аутоиммунное состояние, переболели COVID-19 раньше, являются беременными или кормят грудью.



Побочные эффекты и риски

Некоторые люди могут иметь побочные эффекты после вакцинации — их тяжесть в основном оценивается от лёгкой до умеренной, и длятся они от одного до трёх дней. Побочные эффекты обычно означают, что вакцина работает. К распространённым побочным эффектам относятся покраснение, боль или опухание в месте инъекции, незначительное повышение температуры, головная боль, чувство усталости, мышечные боли, боль в суставах, озноб, тошнота и/или рвота.

Если у Вас есть серьёзная реакция на вакцину или реакция не исчезает через 3 дня, сообщите об этом своему врачу. Министерство здравоохранения отслеживает побочные эффекты, чтобы гарантировать безопасность вакцин.



Вакцина от COVID-19 Novavax Nuvaxovid

Миокардит и перикардит — это типы воспаления в различных областях сердца. Эти состояния могут возникнуть после инфицирования COVID-19, и они вызывают достаточно серьёзные опасения. Это происходит редко после получения Novavax, ведётся тщательный мониторинг этих случаев. Если это происходит, то большинство случаев являются незначительными и лечатся при помощи лекарств и отдыха, и состояние человека улучшается через несколько дней.

Обратитесь к врачу, если после вакцинации у Вас возникли боль в груди, одышка или учащение сердечного ритма. Вакцинироваться по-прежнему рекомендуется, поскольку выгоды вакцинации перевешивают риски.

Ингредиенты вакцины и аллергия

Вакцина содержит полисорбат 80, соли, сахара и буферы. Она не содержит яиц, желатина (свинины), клейковины, латекса, консервантов, антибиотиков и алюминия. В редких случаях могут возникать серьёзные аллергические реакции (анафилаксия). Аллергические реакции лечатся и обычно являются краткосрочными. Если у Вас возникли проблемы с дыханием, высыпание или опухание лица и горла, обратитесь за медицинской помощью.

Люди с серьёзной аллергической реакцией на другую вакцину COVID-19 или полиэтиленгликоль (PEG) могут рассмотреть возможность вакцинации вакциной [Novavax](#).

Отложите вакцинацию, если:

- У Вас повышенная температура или появились любые симптомы COVID-19. Подождите, пока Вам не станет лучше, прежде чем сделать прививку.
- Вам требуется [самоизолироваться](#). Отложите вакцинацию на более позднюю дату, когда период изоляции будет окончен.

Сначала обратитесь за консультацией к лечащему врачу, если Вы:

- Беременны, можете быть беременны или кормите грудью
- Имеете аутоиммунное заболевание
- У Вас ослаблена иммунная система из-за болезни или лечения
- У Вас была аллергическая реакция в течение четырёх часов после получения первой дозы вакцины COVID-19
- У Вас сильная аллергия на любые ингредиенты вакцины [Novavax](#), включая аллергию на полисорбат 80

Для получения более подробной информации обратитесь к своему лечащему врачу или посетите наш веб-сайт toronto.ca/COVID19.



Ресурсы

Национальный консультативный комитет по иммунизации. Заявления и публикации — COVID 19. Доступно по ссылке <https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci.html#cvid-19>

Novavax, Inc. 17 февраля 2022 г. Монография продукта — Nuvaxovid. Доступно по ссылке <https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/nuvaxovid-pm-en.pdf>