

# Hoja informativa sobre la vacuna contra la viruela del mono

## La viruela del mono

La viruela del mono o viruela símica es un virus que causa fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos y cansancio, seguido de un sarpullido y ampollas en la piel. Por lo general, se transmite a través de un contacto muy cercano con alguien que tiene la viruela del mono.

## Información general sobre la vacuna

La vacuna Imvamune®:

- Se ha aprobado en Canadá para la protección contra la viruela del mono.
- Es segura y eficaz.
- Puede utilizarse antes de exponerse al virus (profilaxis previa a la exposición - PrEP) o en los 14 días posteriores a la exposición (profilaxis posterior a la exposición - PEP).
- Puede administrarse a alguien que se haya vacunado contra la viruela en el pasado.
- Se inyecta en la capa grasa del músculo en la parte superior del brazo.
- No deja cicatriz como la versión antigua de la vacuna contra la viruela.
- Le enseña al sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus de la viruela del mono.
- Da una protección que tarda dos semanas en desarrollarse después de la vacunación.
- Contiene el virus modificado y no puede causar la enfermedad.

La vacuna es gratuita y está disponible para las personas elegibles. No necesita presentar una identificación ni tener el OHIP.

## Elegibilidad para la vacuna

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Sanidad de Ontario, se está administrando una dosis de la vacuna a los siguientes grupos elegibles:

- Como profilaxis previa a la exposición (PrEP):
  - a) Hombres y mujeres dos espíritus, no binarios, transgénero o individuos cisgénero que se autoidentifican o que tienen parejas sexuales que se autoidentifican como pertenecientes a la comunidad de hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (gbMSM, por sus siglas en inglés) Y que cumplen al menos uno de los siguientes:
    - Haber tenido una infección de transmisión sexual (ITS) en los últimos 2 meses, como clamidia, gonorrea o sífilis;
    - Haber tenido recientemente dos o más parejas sexuales o que puedan estar planeando tenerlas;
    - Haber asistido recientemente a baños públicos, a clubes sexuales o a un lugar similar para tener contacto sexual o que puedan estar planeando ir, o que trabajen/sean voluntarios en estos lugares;
    - Haber tenido recientemente sexo anónimo/casual o que puedan estar planeando tenerlo, incluyendo el uso de aplicaciones de citas o para ligar en línea;
    - Ser un contacto sexual de una persona que se dedica al trabajo sexual.
  - b) Personas que se dediquen al trabajo sexual o que puedan estar planeando hacerlo.

- c) Personas que sean miembros del hogar o parejas sexuales de personas que cumplan los criterios anteriores Y que a) estén moderada o gravemente inmunodeprimidas O b) estén embarazadas pueden recibir la PrEP tras consultar con su proveedor de atención médica.
- Como profilaxis posterior a la exposición (PEP):
  - Las personas que tienen una exposición conocida o un contacto cercano con alguien que tenga la viruela del mono deben recibir la vacuna como PEP en un plazo de 4 días, pero pueden recibirla hasta 14 días después de la última exposición

Contacte a su profesional de la salud o a la Salud Pública de Toronto para determinar si cumple los requisitos para la PrEP o la PEP.

## Efectos secundarios y riesgos

Al igual que otras vacunas, esta vacuna puede tener algunos efectos secundarios. La mayoría son entre leves y moderados y desaparecen por sí solos en un plazo de 7 días. Entre los efectos secundarios comunes se incluyen:

- Enrojecimiento, dolor o hinchazón en el lugar de la inyección
- Sensación de cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Náuseas

Contacte con un profesional de la salud o acuda al departamento de urgencias más cercano si tiene alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna:

- Urticaria
- Hinchazón de la cara o la boca
- Dificultad para respirar o falta de aliento
- Dolor de pecho o palpitaciones

## Hable con un profesional de la salud antes de vacunarse si:

- Tiene alergias o hipersensibilidad a cualquiera de los [ingredientes](#) de la vacuna, incluyendo: Tris/trometamina, benzonasa de bromobutilo, proteína de pollo, huevo, gentamicina y ciprofloxacina.
- Ha tenido alguna reacción grave a otro tipo de vacuna contra la viruela/viruela del mono.
- Está recibiendo la vacuna Imvamune menos de 4 semanas antes o después de otra vacuna.
- Tiene menos de 18 años.
- Es una persona que está embarazada o en periodo de lactancia.
- Tiene el sistema inmunitario debilitado (incluido por trasplante de órganos o VIH con recuento de CD4 bajo o desconocido).

Espere a vacunarse si presenta algún síntoma de COVID-19, y/o si debe autoaislarse.

Si cree que tiene viruela del mono, es importante que se aisle de inmediato y contacte con un profesional de la salud. En este momento, las personas que tienen o han tenido la viruela del mono no son elegibles para recibir la vacuna.

**Para obtener más información:** Hable con un profesional de la salud o visite [toronto.ca/Monkeypox](https://toronto.ca/Monkeypox)