

猴痘疫苗概况介绍

猴痘

猴痘病毒会引起发烧、头痛、淋巴结肿大和疲倦，随后在皮肤上出现皮疹和水疱。通常经由与猴痘感染者发生密切接触而传播。

疫苗概述

Imvamune® 疫苗：

- 在加拿大已被批准用于预防猴痘。
- 安全有效。
- 可以在接触病毒之前(暴露前预防-PrEP)或接触病毒后14天内(暴露后预防-PEP)使用。
- 可以给曾接种过天花疫苗的人士使用。
- 注射到上臂肌肉顶部的脂肪层中。
- 不会像旧版天花疫苗那样留下疤痕。
- 教导免疫系统识别并对抗猴痘病毒。
- 疫苗接种后需要两周时间才能发挥保护力。
- 含有改良病毒，不会使接种者生病。

疫苗完全免费，符合条件的人士都可以接种。不需要身份证件或OHIP。

疫苗接种资格

根据安大略省卫生厅的指导方针，以下符合条件的群体可接种一剂疫苗：

- 用于暴露前预防(PrEP)：
 - a) 双灵人、非二元性别、跨性别男性和女性，或自我认同属于同性恋、双性恋和有其他男男性行为者(gbMSM)的顺性别者或者有性伴侣自我认同为属于同性恋、双性恋和有其他男男性行为者(gbMSM)的人士，以及至少符合以下一项条件：
 - 在过去2个月内患有性传播感染疾病(STI)，如衣原体、淋病或梅毒；
 - 最近有2个或以上的性伴侣，或可能计划这样做；
 - 最近曾涉足性活动场所(如澡堂、性爱俱乐部)或可能有此打算，或是在这类场所工作/做志愿者的人士；
 - 最近曾发生匿名/随意性行为(如通过在线交友/约炮应用)，或可能有此打算；
 - 与性工作者有性接触的人士。
 - b) 从事性工作或可能计划从事性工作的个人。
 - c) 符合上述标准人士的家庭成员或性伴侣，以及 a)中度至重度免疫力低下或者 b)孕妇，在咨询医护人员后可接受PrEP。

- 对于暴露后预防(PEP):
 - 已知接触过猴痘病毒感染者或与其有过密切接触的人士应在4天内接种疫苗作为PEP措施，但也可以在最后一次接触病毒后14天内接种。

请联系医护人员或多伦多公共卫生局，以了解您是否有资格获得PrEP或PEP。

副作用与风险

像其他疫苗一样，这种疫苗可能会引起一些副作用。大多数副作用为轻度到中度，并会在7天内自行消失。常见副作用包括：

- 注射部位发红、疼痛或肿胀
- 疲倦
- 头痛
- 肌肉疼痛
- 恶心

如果您在接种疫苗后有上述任何症状，请联系医护人员或到最近的急诊科就诊：

- 荨麻疹
- 脸部或口腔肿胀
- 呼吸困难或呼吸急促
- 胸部疼痛或心跳过快

如果您有以下情况，请在接种疫苗前向医疗机构咨询：

- 对任何疫苗成分有过敏反应，包括：Tris/tromethamine、bromobutyl、benzonase、鸡肉蛋白质、蛋类、庆大霉素以及环丙沙星。
- 对其他类型的天花/猴痘疫苗有任何严重反应。
- 在接种另一种疫苗之前或之后不到4周内接种Imvamune疫苗。
- 年龄小于18岁。
- 处于孕期或哺乳期。
- 免疫系统较弱(包括接受过器官移植或感染HIV且CD4计数较低/未知)。

如果您有任何COVID-19症状，和/或需要自我隔离，请暂缓接种疫苗。

如果您认为自己感染了猴痘病毒，请务必立即隔离，并联系医疗机构。目前，已感染或曾经感染猴痘病毒的人士尚无资格接种该疫苗。

更多信息： 请咨询医护人员或浏览 toronto.ca/Monkeypox