

Hoja informativa sobre la vacuna contra MPOX

MPOX

La MPOX (anteriormente conocida como la viruela del mono o viruela símica) es un virus que causa fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos y cansancio, seguido de un sarpullido y ampollas en la piel. Por lo general, se transmite a través de un contacto muy cercano con alguien que tiene la MPOX.

Información general sobre la vacuna

La vacuna Imvamune®:

- Se ha aprobado en Canadá para la protección contra la MPOX.
- Es segura y eficaz.
- Puede utilizarse antes de exponerse al virus (profilaxis previa a la exposición - PrEP) o en los 14 días posteriores a la exposición (profilaxis posterior a la exposición - PEP).
- Puede administrarse a alguien que se haya vacunado contra la viruela anteriormente.
- Se inyecta en la capa grasa sobre el músculo en la parte superior del brazo.
- No deja cicatriz como la versión antigua de la vacuna contra la viruela.
- Le enseña al sistema inmunitario a reconocer y combatir el virus de la MPOX.
- La protección tarda dos semanas en desarrollarse después de la vacunación.
- Contiene el virus modificado y no puede causar la enfermedad.

La vacuna es gratuita y está disponible para las personas elegibles. No necesita presentar una identificación ni tener el OHIP.

Elegibilidad para la vacuna

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Sanidad de Ontario, se está administrando una dosis de la vacuna a los siguientes grupos elegibles:

- Para la profilaxis previa a la exposición (PrEP):
 - a) Personas de dos espíritus, no binarias, hombres y mujeres transgénero o individuos cisgénero que se autoidentifiquen o tengan parejas sexuales que se autoidentifiquen como pertenecientes a la comunidad gay, bisexual y otros hombres que tienen sexo con hombres (gbMSM) Y al menos uno de los siguientes:
 - Haber tenido una infección de transmisión sexual (ITS) en los últimos 2 meses, como clamidia, gonorrea o sífilis;
 - Haber tenido recientemente dos o más parejas sexuales o que puedan estar planeando tenerlas;
 - Haber asistido recientemente a baños públicos, a clubes sexuales o a un lugar similar para tener contacto sexual o que puedan estar planeando ir, o que trabajen/sean voluntarios en estos lugares;
 - Haber tenido recientemente sexo anónimo/casual o que puedan estar planeando tenerlo, incluyendo el uso de aplicaciones de citas o para ligar en línea;
 - Que tengan contacto sexual con una persona que se dedique al trabajo sexual.
 - b) Personas que se dedican al trabajo sexual o que puedan estar planeando hacerlo.
 - c) Personas que sean miembros del hogar o parejas sexuales de otras personas que cumplan los criterios anteriores Y que estén a) de moderada a gravemente inmunodeprimidas O b) embarazadas pueden recibir la PrEP tras consultar con su profesional de la salud.

- Para la profilaxis posterior a la exposición (PEP):
 - Las personas que tienen una exposición conocida o un contacto cercano con alguien que tenga la MPOX deben recibir la vacuna como PEP en un plazo de 4 días, pero puede administrarse hasta 14 días después de la última exposición

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Sanidad de Ontario, pueden administrarse dos dosis de la vacuna con un intervalo de 28 días entre cada una para los siguientes grupos elegibles:

- Individuos que cumplen los criterios provinciales de elegibilidad para la PrEP y que están de moderada a gravemente inmunodeprimidos. Para obtener la segunda dosis se requiere una [carta de derivación](#) de un profesional de la salud o una prueba de medicación.
- Empleados de laboratorios de investigación que trabajen directamente con ortopoxvirus replicantes. Se debe proporcionar el presente [formulario completado](#).

Contacte a su profesional de la salud o a la Salud Pública de Toronto para determinar si es elegible para la PrEP o la PEP.

Efectos secundarios y riesgos

Al igual que otras vacunas, esta vacuna puede tener algunos efectos secundarios. La mayoría son entre leves y moderados y desaparecen por sí solos en un plazo de 7 días. Entre los efectos secundarios comunes se incluyen:

- Enrojecimiento, dolor o hinchazón en el lugar de la inyección
- Sensación de cansancio
- Dolor de cabeza
- Dolores musculares
- Náuseas

Contacte con un profesional de la salud o acuda al departamento de urgencias más cercano si tiene alguno de los siguientes síntomas después de recibir la vacuna:

- Urticaria
- Hinchazón de la cara o la boca
- Dificultad para respirar o falta de aliento
- Dolor de pecho o palpitaciones

Hable con un profesional de la salud antes de vacunarse si:

- Tiene alergia a cualquiera de los [componentes](#) de la vacuna, incluidos: tris/trometamina, bromobutilo, benzonasa, proteína de pollo, huevo, gentamicina y ciprofloxacina.
- Ha tenido alguna reacción grave a otro tipo de vacuna contra la viruela/MPOX.
- Recibe la vacuna Imvamune menos de cuatro semanas antes o después de otra vacuna.
- Tiene menos de 18 años de edad.
- Está embarazada o en periodo de lactancia.
- Tiene el sistema inmunitario débil (incluido haber recibido un trasplante de órgano o tener VIH con recuentos bajos o desconocidos de CD4).

Espere a vacunarse si presenta algún síntoma de COVID-19, y/o si debe autoaislarse.

Si cree que tiene la MPOX, es importante que se aisle de inmediato y se ponga en contacto con un profesional de la salud. En este momento, las personas que tienen o han tenido la MPOX no son elegibles para recibir la vacuna.

Para obtener más información: Hable con un profesional de la salud o visite toronto.ca/MPOX