

21 حزيران/يونيو 2024

تحدث هيئة الصحة العامة في تورونتو على التطعيم مع تزايد حالات الإصابة بالمكورات السحائية من نوع W

حددت هيئة الصحة العامة في تورونتو (TPH) سبع حالات من المكورات السحائية النوع W من أصل 14 حالة من حالات مرض المكورات السحائية الغازية (IMD) التي تم الإبلاغ عنها في عام 2024. وكانت ست من حالات الإصابة بالنوع W السبع ناجمة عن السلالة المطابقة لحالة رُصدت في المملكة العربية السعودية.

وقد شوهدت حالات من المكورات السحائية النوع W في المسافرين العائدين من أداء العمرة في المملكة العربية السعودية إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا. لم يسافر المصابون بالحالات المكتشفة في تورونتو إلى هذه المنطقة ولم يكونوا على اتصال بأي شخص سافر إليها.

رُبطت السلالة W بالعديد من حالات تفشي المرض في جميع أنحاء العالم، وهي معروفة بأنها تسبب مرضًا أكثر خطورة من المجموعات المصلية الأخرى. وقد تزايدت حالات الإصابة به في مناطق مختلفة في السنوات الأخيرة. في حين أن المجموعة المصلية W كانت تقليديًا غير شائعة في تورونتو، إلا أنها تمثل حوالي 21 في المائة من الحالات في الفترة من 2014 إلى 2023. في عام 2024، أبلغت هيئة الصحة العامة في تورونتو عن 14 حالة من حالات مرض المكورات السحائية الغازية من جميع السلالات، بما في ذلك حالتها وفاة، واحدة لدى طفل وواحدة لدى شخص بالغ. هذا هو أكبر عدد من حالات الإصابة بمرض المكورات السحائية الغازية منذ عام 2001، عندما تم الإبلاغ عن 26 حالة.

مع ارتفاع حالات مرض المكورات السحائية في تورونتو، بما في ذلك بين الأشخاص الذين لم يسافروا، إذا كنت قد سافرت أو كنت على اتصال بأفراد سافروا، فاتخذ الاحتياطات المناسبة. يتضمن ذلك عدم مشاركة الطعام أو المشروبات أو الأواني أو الأكواب أو غيرها من الأشياء التي كانت في فم شخص آخر، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضًا بما في ذلك إذا كنت تسعل أو تعطس.

يصادف هذا الأسبوع اختتام موسم الحج السنوي. يجب على الأفراد الذين يعودون الآن إلى كندا تحري أعراض مرض المكورات السحائية الغازية، واتخاذ الاحتياطات المذكورة أعلاه ويُنصحون بالتطعيم ضد سلالة المكورات السحائية W. يمكن أن ينقل الأشخاص مرض المكورات السحائية إلى الآخرين حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض.

مع بدء موسم السفر الصيفي، ومع عودة الأشخاص من المناسبات الدولية مثل الحج والمشاركة في التجمعات المحلية واسعة النطاق، من الضروري استكمال جميع لقاحات المكورات السحائية الموصى بها للحماية من مرض المكورات السحائية الغازية، خاصة وأن العديد من البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية تُبلغ عن زيادة في مرض المكورات السحائية الغازية هذا العام.

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و36 عامًا والذين لم يتلقوا لقاحات المكورات السحائية مؤهلون للحصول على لقاح المكورات السحائية الممول من القطاع العام والذي يحمي من السلالات A وC وY وW. ويُعطى هذا اللقاح عادةً في الصف السابع. القادمون الجدد إلى كندا الذين فاتهم هذا اللقاح مؤهلون أيضًا. يُنصح الأفراد بشدة بالاتصال بمقدم الرعاية الصحية المتابع لهم على الفور لتلقي لقاح المكورات السحائية أو حجز موعد لدى إحدى عيادات تطعيم هيئة الصحة العامة في تورونتو.

عيادات تطعيم هيئة الصحة العامة في تورونتو الخاصة بالمكورات السحائية

يجب على الآباء والأوصياء ومقدمي الرعاية التأكد من تطعيم الأطفال ضد مرض المكورات السحائية الغازية. يُعطى لقاح المكورات السحائية C عادة في عمر 12 شهرًا ويُعطى لقاح المكورات السحائية رباعي النكافؤ ACYW في الصف السابع. كلاهما مطلوب بموجب قانون تطعيم تلاميذ المدارس (ISPA) في أونتاريو.

يمكن حجز المواعيد للأطفال في سن المدرسة والبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و38 عامًا الذين فاتهم التطعيم ضد المكورات السحائية على TPHbookings.ca. ستتوفر المواعيد للبالغين ابتداءً من 28 حزيران/يونيو. ابحث عن مواقع العيادات وتواريخها وأوقاتها المحدثة على www.tphbookings.ca.

مرض المكورات السحائية الغازية

مرض المكورات السحائية الغازية هو التهاب بكتيري شديد وحاد، يرتفع فيه معدل الوفيات ويظهر مع التهاب السحايا و/أو الإنتان، وغالبًا ما يتطور بسرعة ويتطلب دعمًا طبيًا وعلاجًا سريعًا بالمضادات الحيوية. أعلى نسبة حدوث تحصل عند الأطفال الصغار والمراهقين والشباب.

هذه الأمراض غالبًا ما تكون شديدة ويمكن أن تكون مميتة. يمكن أن تشمل التهابات في بطانة الدماغ والحبل الشوكي (التهاب السحايا) ومجرى الدم.

تبدأ الأعراض عادةً بالحمى والأوجاع وآلام المفاصل والصداع وتيبس الرقبة وزيادة الحساسية للضوء.

ينتشر مرض المكورات السحائية الغازية من خلال الاتصال الوثيق والمباشر باللعب من الفم أو المخاط من أنف شخص مصاب بالمرض.

الأمثلة تشمل:

- التقبيل أو السعال أو العطس
- مشاركة أشياء مثل الطعام أو المشروبات أو أدوات الطعام أو فراشي الأسنان أو واقيات الفم أو السجائر أو السوائل الإلكترونية أو أحمر الشفاه مع شخص مصاب
- العيش مع شخص مصاب بمرض المكورات السحائية

يمكن للشخص أن ينشر مرض المكورات السحائية لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل أن يصاب بالمرض وحتى 24 ساعة بعد بدء العلاج بالمضادات الحيوية.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، يرجى طلب العناية الطبية الفورية. تفضل زيارة toronto.ca/meningococcal لمزيد من المعلومات.

تعد تورونتو موطنًا لأكثر من ثلاثة ملايين شخص، حيث يجعل تنوعهم وخبراتهم من هذه المدينة العظيمة المحرك الاقتصادي الرائد في كندا وواحدة من أكثر مدن العالم تنوعًا وقابلية للعيش. باعتبارها رابع أكبر مدينة في أمريكا الشمالية، تعد تورونتو رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا والتمويل والأفلام والموسيقى والثقافة والابتكار والعمل المناخي، وتحتل دائمًا مكانًا في أعلى التصنيفات الدولية بسبب الاستثمارات التي تدعمها حكومتها وسكانها وشركاؤها. للمزيد من المعلومات تفضل زيارة www.toronto.ca أو تابعونا على تويتر على www.twitter.com/CityofToronto، على الانستغرام على www.instagram.com/cityofto أو على الفيسبوك على www.facebook.com/cityofto.

- 30 -

للتواصل الاعلامي:

العلاقات الإعلامية لهيئة الصحة العامة في تورونتو، TPHmedia@toronto.ca