



미세색소주입술- 감염 예방 및 관리 지침

미세색소주입술 시작 전

- 세척 및 소독할 수 없는 모든 조명 기구, 분무병 및 미세색소 주입펜/기기의 일부분(예: 코드)을 일회용 비닐 랩으로 덮으십시오. 고객마다 새 비닐 랩을 사용해야 합니다.
- 재사용 가능한 미세색소 주입펜 부분은 먼저 비누와 물로 세척하고 말린 후 고강도 소독제로 고객 사이마다 소독해야 합니다. 토론토 공중 보건국에서는 멸균 포장되고 일회용 부품을 사용하는 펜이나 기계를 사용할 것을 적극 권장합니다.
- 펜에서 바늘을 고정하는 부분은 반드시 멸균 상태여야 합니다. 이 “바늘 홀더나 바늘”은 멸균 포장된 일회용으로 구입해야 합니다.
- 고객 사이마다 머리 받침대, 작업대 및 의자를 세척하고 소독하십시오. 저장도 소독제를 사용하십시오.
- 절차 및 관련 위험에 대하여 고객에게 고지하십시오.
- 시술을 가할 피부 부위에 붉기, 부기 또는 발진이 있는지 검사하십시오. 염증이 있거나 감염되거나 발진이 있는 피부의 6 인치 부위 이내에 영구 화장 시술을 피하십시오.
- 일회용 장갑을 착용하기 전과 장갑을 벗은 후에 손을 깨끗이 닦으십시오.
- 고객마다 일회용 장갑 새것을 착용하십시오.
- 70% 아이소프로필 알코올과 같은 승인된 소독제로 해당 피부 부위를 세척하십시오. 일회용 면봉을 사용하십시오.
- 크림, 로션, 연고 및 잉크 분사 시 오염되지 않는 방식으로 분사하십시오.
- 해당 부위에 체모를 제거하기 위해 면도칼을 반드시 사용해야 할 경우, 이는 멸균 상태여야 하며, 사용 후 즉시 승인된 날카로운 용품 수거함에 버려야 합니다. 날카로운 용품 수거함은 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다.

기록 보관

- 고객의 이름, 주소, 전화번호, 시술 날짜 및 유형, 서비스를 제공할 사람의 이름을 기록하십시오.
- 기록 추적용으로 멸균 포장 상태로 구입한 기기 또는 바늘에 대한 기록을 보관하십시오.
- 고객 및 현장 사고 노출 기록을 최소 3 년간 보관하고, 최소 1 년(365 일) 동안 현장에 보관하십시오.

잉크 캡 및 잉크

- 70% 아이소프로필 알코올과 같은 중간 강도의 소독제를 사용하기 전에 일회용 잉크 뚜껑을 세척하고 소독하십시오.
- 일회용 잉크 캡은 각 고객에게 사용 후 폐기하십시오. 남은 잉크도 폐기하십시오. 시술 중에 잉크가 추가로 필요한 경우, 새 일회용 잉크 캡을 사용하십시오.
- 폼 인서트(foam inserts)는 사용이 허용되지 않습니다.
- 링 잉크 캡은 작업상의 위험 때문에 권장되지 않습니다.
- 재사용 가능한 모든 잉크 캡은 고객 사이마다 멸균해야 합니다.
- 잉크 캡 홀더를 사용하는 경우 고객 사이마다 세척하고 소독해야 합니다. 고강도 소독제를 사용하십시오.
- 잉크를 희석할 경우 멸균수를 사용해야 합니다. 수돗물을 사용하여 잉크를 희석하지 마십시오.

사후 관리 지침

- 모든 손님은 영구 화장 부위를 어떻게 관리하는지 그리고 피부가 붉어지거나, 붓거나, 불편감을 느낄 경우 어떻게 해야 하는지에 대한 정보를 구두와 서면으로 받아야 합니다.

질문이나 문의 사항이 있습니까? BodySafe@toronto.ca 또는 416-338-BODY(2639)로 BodySafe 에 문의하십시오.