



微色素沉著 - 預防和控制感染實踐操作

開始微色素沉著之前

- 使用單次使用塑料膜覆蓋所有燈具、噴霧瓶、以及微色素沉著筆 / 機器中無法清潔和消毒的零件 (例如電線)。服務不同顧客時，必須使用新的塑料膜。
- 微色素筆可重複使用的部分必須先用肥皂和清水清洗、乾燥，每次使用後用高強度消毒劑消毒。多倫多公共衛生局強烈建議您使用的筆或機器所配部件應為預先包裝、無菌、且僅供單次使用。
- 筆中容納針頭的部分必須是無菌的。這些「持針器或針尖」應購買預先包裝、無菌且單次使用的產品。
- 在服務不同顧客時需要清潔消毒頭枕、工作台及椅子。使用低強度消毒劑。
- 向客戶提供有關程序和相關風險的資訊。
- 檢查要治療的皮膚區域是否發炎或有皮疹。避免在發炎、受感染或出現皮疹的皮膚六英吋範圍內進行永久化妝治療。
- 戴上一次性手套前後清潔雙手。
- 服務每位顧客時戴上新的即棄手套。
- 使用經批准的消毒劑 (例如 70% 異丙醇) 清潔皮膚區域。使用即棄棉籤。
- 分配乳霜、乳液、軟膏和墨水時，注意防止污染。
- 如果需要使用剃刀剃鬚，該區域必須消毒，並在使用後立即丟棄到獲准使用的銳器容器中。銳器容器不能與普通垃圾一起丟棄。

保存記錄

- 記錄客戶的姓名、地址、電話號碼、日期和手術類型，並記錄提供服務的人員姓名。
- 保留購買的預先包裝且無菌的器械或針頭的記錄，以便追蹤。
- 將客戶記錄和意外接觸記錄保留三年，其中現場保留時間不少於一年 (365 天)。

墨水蓋和墨水

- 使用前用中強度消毒劑（例如 70% 異丙醇）對即棄墨水蓋進行清潔消毒。
- 每次服務完成後，應棄置即棄墨水蓋。棄置剩餘的墨水。如果在手術過程中額外需要墨水，請使用新的即棄墨水蓋。
- 不允許使用泡棉襯墊。
- 由於存在職業風險，不建議使用環形墨水蓋。
- 所有可重複使用的墨水蓋必須在服務不同顧客之前消毒。
- 如果使用墨水蓋支架，則必須在每次使用前清潔消毒。使用高強度消毒劑。
- 稀釋墨水時應使用無菌水。請勿使用自來水稀釋墨水。

善後護理說明

- 應口頭及書面告知每位顧客如何護理永久美容成果以及永久美容區域出現變紅、腫脹或不適時應採取的應對措施。

有問題 / 查詢？請發送電郵到 BodySafe@toronto.ca 或致電 416-338-BODY(2639) 聯絡 BodySafe。