



紋身 - 預防和控制感染實踐操作

開始紋身之前

- 記錄客戶的姓名、地址、電話號碼、日期、手術類型以及刺青師的姓名。
- 將客戶記錄、意外接觸記錄和預包裝無菌物品記錄保留至少三年，其中現場保留時間不少於一年 (365 天)。
- 記錄預包裝無菌物品 (包括針頭) 的製造商、批號和有效期限。
- 遮蓋所有燈具、噴霧瓶以及刺青機上無法清潔和消毒的零件。使用單次使用塑料膜。服務不同顧客時，必須使用新的塑料膜。
- 在接待不同顧客之前清潔消毒頭枕、工作台及椅子。使用低強度消毒劑。
- 向客戶提供有關手術和相關風險的資訊。
- 檢查將要紋身的皮膚區域是否有發炎或皮疹。避免在發紅、腫脹、受感染或出現皮疹的皮膚 6 英寸範圍內進行紋身。
- 戴上即棄手套前後，清潔雙手。
- 服務每位顧客時戴上新的即棄手套。
- 使用已獲准的消毒劑 (例如 70% 異丙醇) 清潔皮膚區域。使用即棄式棉籤。
- 不建議使用除臭棒來塗抹模板。
- 塗抹乳霜、乳液、藥膏及墨水時，注意防止污染，使用手動泵或即棄塗抹棒。
- 如果需要使用刮鬍刀剃乾淨該區域的毛髮，刮鬍刀必須消毒並在使用後立即丟棄，將刮鬍刀丟棄到獲准使用的銳器容器中。銳器容器不能與普通垃圾一起丟棄。

準備紋身用針

- 多倫多公共衛生局建議使用市面購入的預先包裝、無菌、即時使用的針頭及針桿。將這些物品的記錄保留至少三年，其中現場保留時間不少於一年 (365 天)
- 如果針頭由刺青師準備，必須購買預先包裝的無菌針頭。必須在超音波清潔器中清潔針和針桿，並在使用前重新消毒包裝。物品的滅菌日期必須寫在包裝上。

- 在客戶面前從包裝中取出預先包裝的無菌器械和針頭。
- 使用後立即將針和針桿丟棄到獲批使用的銳器容器中。銳器容器不能與普通垃圾一起丟棄。

使用滅菌器給設備消毒滅菌

- 任何要消毒的物品都必須先進行清潔。可使用超音波清洗機可用於清潔器械，為器械滅菌消毒做好準備。
- 所有物品在滅菌消毒前都必須包裝好。
- 必須密切關注滅菌器工作，確保其正常運作。
- 檢測分為三類：生物、化學和物理。
- 欲了解更多資訊，請參閱[滅菌 - 預防及控制感染網頁](#)。

孢子測試失敗

- 請勿使用孢子測試失敗設備中消毒過的任何器械，也不要使用最近一次通過孢子測試後滅菌消毒的任何物品。
- 您可以使用高壓滅菌器通過孢子測試期間完成滅菌消毒的任何器械或使用購買的預先包裝無菌物品。
- 將[孢子測試失敗情況](#)向多倫多公共衛生局報告。

化學指示條顯示測試失敗 (未改變顏色)

- 如果包裝中看不到內部指示條，請立即使用其它內部化學指示條 (類型 4) 外加外置化學指示條重新處理物品。
- 如果化學指示條再次顯示測試失敗：
 - 停止使用未通過指示條測試的消毒物品並
 - 立即進行孢子測試。
- 在獲得孢子測試結果之前，使用上次通過孢子測試期間重新處理的物品或使用在市面購買的預先包裝無菌物品。

墨水蓋和墨水

- 多倫多公共衛生局建議使用單次使用的墨水蓋。使用前清潔消毒墨水蓋。使用中等強度消毒劑 (例如 70% 異丙醇)。
- 每次服務完成後，應棄置即棄墨水蓋。丟棄所有剩餘墨水。如果在過程中需額外墨水，請使用新的即棄墨水蓋。
- 不允許使用泡棉襯墊。
- 由於存在職業風險，不建議使用環形墨水蓋。
- 服務不同客戶時，可重複使用的墨水蓋必須消毒。
- 如果使用墨水蓋支架，則必須在每次使用前進行清潔消毒。使用高強度消毒劑。
- 稀釋墨水時應使用無菌水。請勿使用自來水稀釋墨水。

善後護理說明

應口頭及書面告知顧客紋身後如何護理皮膚，以及皮膚如果變紅、腫脹或不適應該如何處理。

有問題 / 查詢？請發送電郵到 BodySafe@toronto.ca 或致電 416-338-BODY(2639) 聯絡 BodySafe。