바디 피어싱 – 감염 예방 및 관리 지침

피어싱 시행 전

- 고객의 이름, 주소, 전화번호, 시술 날짜 및 유형, 피어싱 시술자의 이름을 기록하십시오.
- 고객 및 사고 노출 기록을 최소 3 년간 보관하고, 최소 1 년(365 일) 동안 현장에 보관하십시오.
- 절차 및 관련 위험에 대한 정보를 고객에게 고지하십시오.
- 저강도 소독제를 사용하여 고객 사이마다 머리 받침대, 작업대 및 의자를 세척하고 소독하십시오.
- 피부를 관통할 부위에 붉기, 부기 또는 발진이 있는지 검사하십시오. 빨갛거나, 붓거나, 감염되었거나 발진이 있는 피부 주위 6 인치 이내에는 피어싱을 피하십시오.
- 일회용 장갑을 착용하기 전과 장갑을 벗은 후에 손을 깨끗이 닦으십시오.
- 고객마다 일회용 장갑 새것을 착용하십시오.
- 펌프나 일회용 스틱을 사용하여 오염을 방지하는 방식으로 크림, 로션 및 연고를 분사하십시오.
- 피부에 표시하기 전에, 70% 아이소프로필 알코올과 같은 승인된 소독제로 해당 부위를 세척하십시오. 피부가 눈에 띄게 더러워진 경우 소독제를 바르기 전에 비누와 물로 피부를 세척하십시오.
- 일회용 면봉을 사용하십시오. 일단 피부에 표시를 하면, 잉크가 마를 때까지 1 분을 기다린 다음 피어싱 직전에 해당 부위를 다시 클렌징 하십시오. 승인된 피부 소독제를 사용하십시오.

피어싱 장비

- 모든 패키지의 내부 화학 지표에 색상이 변경되었는지 확인하십시오. 외부 화학 지표가 있다면 그것도 살펴보십시오.
    - 기구가 멸균기를 통과한 후 지표의 색상이 무엇이어야 하는지 잘 모르는 경우, 지표와 함께 제공된 정보를 참조하거나, 제조업체 또는 공급업체에 문의하십시오.
    - 지표에 대한 자세한 내용은 멸균 – 감염 예방 및 관리 팩트 시트를 참조하십시오.
- 바늘과 피부과 펀치(생검) 도구는 고객이 보는 앞에서 포장지에서 꺼내어 승인된 날카로운 용품 수거함에 폐기해야 합니다. 날카로운 용품 수거함은 일반 쓰레기와 함께 버릴 수 없습니다.
- 주얼리는 멸균 포장 상태여야 합니다. 주얼리를 멸균 포장 상태로 구입하지 않은 경우, 사용 전 반드시 세척하고 멸균해야 합니다.

- 겸자, 플라이어, 가위 및 바늘 푸셔는 고객 사이마다 세척 및 멸균해야 합니다.
- 사용 후 즉시 세척할 수 없는 기구는 "더러운 기구"라고 표시된 용기에 물이나 물과 세제를 섞어 담가 두어야 합니다.

화학 지표의 색상이 변하지 않은 경우 어떻게 하는가?

- 내부 화학 지표를 사용하여 동일한 아이템을 즉시 재처리하십시오. 밀봉된 패키지 안에서 내부 지표를 볼 수 없는 경우 외부 지표가 필수로 요구됩니다.
- 지표가 다시 불합격으로 나오면, 불합격한 해당 장비 사용을 중지하고 즉시 아포 검사를 수행하십시오.
- 마지막으로 아포 검사를 통과한 재처리 장비를 사용하거나, 아포 검사 결과를 얻을 때까지는 사전 포장 상태로 구입한 멸균 아이템을 사용합니다.

멸균기가 아포 검사에 불합격한 경우 어떻게 하는가?

- 불합격으로 나온 장비와, 마지막으로 아포 검사를 통과한 이후 멸균한 이이템을 사용하지 마십시오. 혹시 우연히 모르고 사용하지 않도록 이러한 패키지를 개봉해 놓는 것이 가장 좋습니다.
- 직원에게 사용 금지를 알리기 위해 즉시 멸균기에 표기하여 통지하십시오.
- 멸균기가 아포 검사를 통과한 기간 동안에 멸균된 장비는 다 사용할 수 있고 아니면 사전 포장 상태로 구입한 멸균 제품을 사용할 수 있습니다.
- 불합격한 아포 시험을 토론토 공중 보건국에 보고하십시오.

사후 관리 지침

- 모든 손님은 피어싱 후 자신의 피부를 어떻게 관리하는지 그리고 피부가 붉어지거나 붓거나 불편감을 느낄 경우 어떻게 해야 하는지에 대한 정보를 구두와 서면으로 받아야 합니다.

질문이나 문의 사항이 있습니까? BodySafe@toronto.ca 또는 416-338-BODY(2639)로 BodySafe 에 문의하십시오.