



## Tatouage — Pratiques de prévention et de contrôle des infections

### Avant de commencer le tatouage

- Notez le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone, la date et le type de procédure, ainsi que le nom du tatoueur.
- Conservez les dossiers des clients, des expositions accidentelles et des articles stériles préemballés pendant au moins trois ans, dont un minimum d'un an (365 jours) sur place.
- Notez le nom du fabricant, le numéro de lot et la date d'expiration des articles stériles préemballés, y compris les aiguilles.
- Couvrez tous les luminaires, les vaporisateurs et les pièces de la machine à tatouer qui ne peuvent pas être nettoyés et désinfectés. Utilisez une pellicule plastique à usage unique. Une nouvelle pellicule plastique doit être utilisée pour chaque client.
- Nettoyez et désinfectez les appuie-têtes, les tables de travail et les chaises entre les clients. Utilisez un désinfectant de bas niveau.
- Fournissez au client des informations sur la procédure et les risques associés.
- Examinez la zone de la peau qui sera tatouée pour détecter une inflammation ou une éruption cutanée. Évitez de tatouer à moins de 15 cm d'une peau rouge, enflée, infectée ou présentant une éruption cutanée.
- Lavez-vous les mains avant de mettre des gants jetables à usage unique et après avoir retiré les gants.
- Utilisez une nouvelle paire de gants jetables à usage unique pour chaque client.
- Nettoyez la zone cutanée avec un antiseptique approuvé tel que l'alcool isopropylique à 70 %. Utilisez un coton-tige jetable.
- Les bâtons déodorants ne sont pas recommandés pour l'application de pochoirs.
- Distribuez les crèmes, lotions, onguents et encres de manière à éviter toute contamination. Utilisez une pompe ou un bâtonnet d'encre jetable.
- Si un rasoir est nécessaire pour raser la zone, il doit être stérile et jeté immédiatement après utilisation, Jetez le rasoir dans un récipient pour objets tranchants autorisé. Les récipients pour objets tranchants ne peuvent pas être jetés dans les ordures ménagères.

### Préparez vos propres aiguilles

- Le Bureau de santé publique de Toronto recommande d'utiliser des aiguilles et des barres à aiguilles achetées préemballées, stériles et prêtes à l'emploi. Conservez les registres de ces éléments pendant au moins trois ans, dont un minimum d'un an (365 jours) sur place.

- Si les aiguilles sont préparées par l'artiste, les aiguilles doivent être achetées préemballées et stériles. L'aiguille et la barre à aiguille doivent ensuite être nettoyées dans un nettoyeur à ultrasons, reconditionnées et stérilisées avant utilisation. La date à laquelle l'article a été stérilisé doit être inscrite sur l'emballage.
- Retirez les instruments et les aiguilles stériles préemballés de leur emballage devant les clients.
- Jetez les aiguilles et les barres à aiguilles dans un conteneur pour objets tranchants approuvé immédiatement après utilisation. Les contenants pour objets tranchants ne peuvent pas être jetés dans les ordures ménagères.

### **Stérilisation du matériel dans un stérilisateur**

- Tout objet à stériliser doit d'abord être nettoyé. Un nettoyeur à ultrasons peut être utilisé pour nettoyer les instruments avant la stérilisation.
- Tous les articles doivent être emballés avant d'être stérilisés.
- Les stérilisateurs doivent être surveillés pour garantir leur bon fonctionnement.
- Trois types de surveillance sont nécessaires : biologique, chimique et physique.
- Pour plus d'informations, consultez la [Page Web sur la stérilisation — Prévention et contrôle des infections](#).

### **Échec des tests de spores**

- N'utilisez aucun équipement provenant de la charge échouée ni aucun article stérilisé après le dernier test de spores réussi.
- Vous pouvez utiliser tout équipement stérilisé pendant la période où l'autoclave a réussi le test des spores ou utiliser des articles stériles préemballés achetés.
- Signalez l'[échec du test de spores](#) au Bureau de santé publique de Toronto.

### **Indicateur chimique défaillant (n'a pas changé de couleur)**

- Retraiter immédiatement les articles en utilisant un autre indicateur chimique interne (type 4) et un indicateur chimique externe si l'indicateur interne n'est pas visible dans l'emballage.
- Si l'indicateur chimique échoue à nouveau :
  - arrêtez d'utiliser les éléments des tests d'indicateurs ayant échoué;
  - effectuez immédiatement un test de spores.
- Utilisez des articles retraités à partir du dernier test de spores réussi ou utilisez des articles achetés, préemballés et stériles jusqu'à ce que vous obteniez les résultats du test de spores.

### **Capuchons d'encre et encre**

- Le Bureau de santé publique de Toronto recommande d'utiliser des capuchons d'encre jetables. Nettoyez et désinfectez les capuchons d'encre avant utilisation. Utilisez un désinfectant de niveau intermédiaire tel que l'alcool isopropylique à 70 %.

- Jetez les capuchons d'encre jetables après chaque client. Jetez l'encre restante. Utilisez un nouveau capuchon d'encre jetable si de l'encre supplémentaire est nécessaire pendant la procédure.
- L'utilisation d'inserts en mousse n'est pas autorisée.
- Les capuchons à encre annulaire ne sont pas recommandés en raison du risque professionnel.
- Stérilisez les capuchons d'encre réutilisables entre chaque client.
- Si un capuchon d'encre est utilisé, il doit être nettoyé et désinfecté entre chaque client. Utiliser un désinfectant de haut niveau.
- De l'eau stérile doit être utilisée pour diluer l'encre. N'utilisez pas d'eau du robinet pour diluer l'encre.

### **Instructions d'entretien**

Chaque client doit être informé et recevoir des informations écrites sur la façon de prendre soin de sa peau après son tatouage et sur ce qu'il doit faire si sa peau devient rouge, gonflée ou inconfortable.

Avez-vous des questions ou des demandes de renseignements? Veuillez communiquer avec BodySafe à l'adresse [BodySafe@toronto.ca](mailto:BodySafe@toronto.ca) ou au 416 338-BODY(2639).